


FICHA TÉCNICA	Fecha:21/11/2016	
METAREX SD	Reemplaza:	
	Número de revisión: 1	

Identificador del preparado: METAREX SD

Usos pertinentes identificados: Producto fitosanitario: molusquicida en forma de cebo para el control de caracoles y babosas para uso exclusivo en agricultura.

Datos del Formulador **DE SANGOSSE S.A.S**
 Bonnel – BP 5
 47480 PONT DU CASSE (Francia)
 Telf: +33 05 53 69 36 30 - Fax: +33 05 53 66 30 65
 e-mail : fds@desangosse.com

METAREX SD contiene BITREX® (denatonium benzoate)

METAREX SD es un molusquicida, tiene acción estomacal y por contacto. Los caracoles/babosas intoxicadas con metaldehyde segregan grandes cantidades de “baba” se desecan y mueren. Sus células productoras de mucosidad irreversiblemente se destruyen.


MODO DE USO:

Aplicar la dosis recomendada de **METAREX SD**, cuando las observaciones en campo muestren una presencia sostenida y activa de caracoles y babosas. Las aplicaciones serán más eficaces si se realizan antes de la emergencia del cultivo (cultivos anuales) o antes de que se observen daños y/o antes de la subida de los caracoles al cultivo (cultivos perennes).

Aplicar **METAREX SD** preferentemente sobre suelo húmedo, ya que la atractividad del cebo aumenta en condiciones humedad. No aplicar sobre suelo seco. Realizar aplicaciones después del riego y no volver a regar durante 48 horas después de la aplicación.

Aplicar a mano (por voleo) o con maquinaria correctamente calibrada, la aplicación se puede hacer sobre toda la superficie, en los márgenes de campo, en el surco de siembra o mezclado con las semillas, dependiendo del cultivo. **METAREX SD** no debe aplicarse en montones.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS kg/ha
BRÓCOLI (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>Botrytis</i> subvar. <i>cymosa</i> Lam)	BABOSA (<i>Derocera reticulatum</i>)	3 - 5
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	CARACOL MANZANA (<i>Pomacea canaliculata</i>)	3

FICHA TÉCNICA	Fecha:21/11/2016	
METAREX SD	Reemplaza:	
	Número de revisión: 1	

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Se recomienda la aplicación de forma preventiva un día antes del trasplante o siembra al voleo repitiendo la aplicación cada ocho días, con la finalidad de obtener un mejor control de la plaga; también se recomienda la aplicación a los bordes de la piscina.

Para brócoli aplicar con dispensador en los caminos y entre las plantas, repitiendo la aplicación cada 15 días.

PRECAUCIONES:

Este producto no puede aplicarse en sitios residenciales (por ejemplo, en patios, jardines, alrededor de casas y apartamentos) y otros sitios como las áreas exteriores alrededor de escuelas y guarderías, y campos deportivos, parques, parques, áreas recreativas, etc.

Utilizar sólo como tratamiento de cebo para aplicar directamente al área del suelo debajo de las plantas; Este producto no debe ser aplicado al follaje o cualquier otra parte de las plantas. No permita que el pellet de cebo entre en contacto con las partes de la planta.

INCOMPATIBILIDAD: El producto está recomendado para ser usado solo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico cuando se usa según recomendaciones de esta etiqueta.


PERÍODO DE CARENCIA: No corresponde, no se aplica sobre el cultivo. Sin embargo considerar un periodo de 12 días para Brócoli; en el caso de arroz, se puede usar **METAREX SD** hasta 30 días después de que el cultivo se ha establecido.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA (PERSONAS Y ANIMALES): Se puede reingresar al área tratada una vez hecha la aplicación. No se define un período de reingreso para animales ya que el producto no está indicando para ser utilizado en zonas de pastoreo ni lugares donde estos se encuentran.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN:

Este producto puede ser dañino para los niños y fatal para los perros y otros animales domésticos si se ingiere. Se ha sabido que los perros ingieren metaldehído después de abrir o rasgar el envase. Guarde este producto en su embalaje original, en un lugar fresco y seguro y fuera del alcance de los niños y las mascotas.

No arroje restos del producto ni su envase a la basura común, ni al sistema de alcantarillado, ni a fuentes de agua.

FICHA TÉCNICA	Fecha:21/11/2016	 DE SANGOSSE
METAREX SD	Reemplaza:	
	Número de revisión: 1	

IMPORTANTE: Respetar los usos, las dosis, las condiciones y las instrucciones de uso indicadas en la etiqueta, que están determinadas en función de las características del producto y de las aplicaciones para las que se recomiendan. Sobre esta base, realizar el cultivo y los tratamientos de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas, teniendo en cuenta, bajo su responsabilidad, todos los factores específicos relativos a su explotación agrícola, tales como las características del suelo, las condiciones climáticas, los métodos de cultivo, las variedades y sus resistencias específicas. El fabricante garantiza la calidad de sus productos sólo en su embalaje inicial durante el período indicado en los certificados del fabricante. El fabricante garantiza la composición indicada en el envase y está acorde con los reglamentos vigentes. Los folletos con las medidas de precaución están disponibles bajo petición. Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios realizados bajo las Buenas Prácticas Agrícolas.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

ChemCrop

Av. del Bombero Mz. 56 Solar 6,
 Bodegas Almax No. 1
 Guayaquil - Ecuador
 Telf.: 2359051
www.chemcrop.com
 Mail: info@chemcrop.com