



COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

	Porcentaje en peso
Ingrediente activo	
Clorotalonil: Tetracloroisoftalonitrilo	
No menos de	54.00%
(Equivalente a 720 g de I.A./L a 25°C)	
Ingredientes inertes	
Dispersante, humectante, espesantes y diluyente	
No más de	46.00%
Total	100.00%

INSTRUCCIONES DE USO:

Siempre calibre el equipo de aplicación

HELMONIL® es un fungicida formulado como suspensión acuosa, recomendado para la prevención y control de las enfermedades indicadas en el cuadro.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS

Cultivo	Enfermedad	Dosis (L/ha)	Observaciones
Chile (SL)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.5-3.0	Se recomienda hacer 3 aplicaciones. Comience las aplicaciones cuando se presenten los primeros síntomas o cuando la enfermedad amenace, y repita cada 7 días según la necesidad para mantener control.
Frijol (7)	Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	3.0-4.0	Comience las aplicaciones durante el inicio de la floración o cuando la enfermedad amenace, y repita semanalmente según la necesidad para mantener control.
Jitomate (SL) Papa (SL) Tabaco (SL)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.5-3.5	Se recomienda hacer 3 aplicaciones. Comience las aplicaciones cuando se presenten los primeros síntomas o cuando la enfermedad amenace, y repita cada 7 días según la necesidad para mantener control.
Plátano (7)	Sigatoka negra (<i>Micosphaerella fijensis</i>)	1.5-2.5	Realizar 4 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.
Zanahoria (SL)	Tizón foliar (<i>Cercospora carotae</i>)		Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad y se presenten las condiciones favorables para su desarrollo.
Papayo (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum</i>)	1.5-3.0	Aplique al follaje y al tronco central en forma preventiva, en cuanto aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad.

Mango (21)	<i>gloeosporioides)</i>	1.5-2.5	Inicie las aplicaciones en cuanto se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Repita a intervalos de 14 días.
Pepino Melón Sandía Calabaza Calabacita (SL)	Mildiú de las cucurbitáceas (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	2.0-3.0	Aspersión foliar preventiva en cuanto se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Dos aplicaciones a intervalo de 7 días.

() = Intervalo de seguridad en días.

SL = Sin límite.

HELM DE MÉXICO, S.A.

Protón Núm. 2 Parque Industrial Naucalpan - 53489 Naucalpan, Edo. de México

Tel.: (55) 5228-9900 ext. 296 y 303 - Fax: (55) 5300-5731 - e-mail: helm@helm-mexico.com.mx