



International

Ficha Técnica

Descripción del producto.

BRIGAND pellets es un rodenticida que está listo para su uso y está formulado con una mezcla de cereales, azúcares, proteínas y grasas, con adyuvantes de sabor para mejorar la "aceptación" del cebo. El cebo en pellets ofrece una aplicación extremadamente equilibrada y es ideal cuando la población de roedores objetivo se ha alimentado con piensos compuestos.

BRIGAND pellets es muy apetecible y eficaz contra todas las plagas de roedores. El cebo en pellets ofrece una vida útil extremadamente larga y puede utilizarse en interiores y exteriores si está bien protegido de la humedad.

Está formulado en base a Bromadiolona, el ingrediente activo recomendado internacionalmente para usos en viviendas por su menor toxicidad comparativa con otros ingredientes activos. BRIGAND Pellets posee Benzoato de Denatonium, una sustancia preventiva de la ingesta humana accidental, lo que incrementa su coeficiente de seguridad para manipuladores, adultos y principalmente niños.

Instrucciones de Uso.

Plagas	Dosis
Para Ratas	20 a 40 gramos / 5 a 15 metros lineales según grado de infestación.
Para Ratones	10 a 20 a gramos / 3 a 5 metros lineales según grado de infestación.

Coloque cebo donde hay signos de actividad de roedores, como excremento fresco, dentro o cerca de madrigueras, rutas, lugares de alimentación de roedores.

Ante infestaciones altas se debe incrementar los puntos de control, así como los la frecuencia de reposición que no debe ser superar el periodo de 30 a 45 días.

Seguimiento.

Si todo el cebo ha sido comido de ciertas áreas o puntos, aumente la cantidad de cebo mediante la colocación de más puntos en el área, no aumente el tamaño cada punto, en general, es más eficiente utilizar un mayor número de pequeños puntos de cebo en comparación con un menor número de puntos grandes de cebo. Buscar y eliminar los roedores muertos a intervalos frecuentes durante el tratamiento, por lo menos con la frecuencia con la que se inspeccionan o reponen los cebos.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Información general: En caso de ingesta o malestar, acuda al médico. El Bromadiolona es un anticoagulante indirecto, el sangrado puede aparecer varios días después de la exposición. Los síntomas de envenenamiento son: hematomas, sangrado de la nariz, sangrado urinario, palidez de las mucosas, fatiga, respiración esforzada.

Antídoto: Fitomenadiona (Vitamina K1). Si no hay sangrado activo el INR (tiempo de protrombina) debe medirse al momento de la exposición y 48-72 horas después de la exposición. Si el INR es mayor que 4, administrar vitamina K1 (Fitomenadiona) 5-10 mg por inyección intravenosa lenta (100 mg / kg de peso corporal para un niño) hasta que el tiempo de protrombina se normalice. El tratamiento con Fitomenadiona (por vía oral o por vía intravenosa) puede ser necesario durante varias semanas. Por ello, continúe la determinación de tiempo de protrombina durante dos semanas después de la administración de antídoto y reanude el tratamiento si se produce una elevación en ese momento.

En caso de inhalación: Es poco probable que represente peligro por inhalación. En caso de síntomas mueva a la persona afectada al aire libre. Inmediatamente obtenga ayuda médica.

Contacto con la piel: Puede causar irritación de la piel en personas susceptibles. Remueva inmediatamente las prendas contaminadas. Lave la piel con abundante agua y jabón. Si hay malestar, acuda inmediatamente al médico.

En caso de emergencia llamar: 911 - 1800 VENENO - 04-6005466.

Tras contacto con los ojos: Puede causar irritación en los ojos en personas con sensibilidad. Lave los ojos durante varios minutos con agua corriente. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

En caso de ingesta: Enjuague la boca. NO provoque el vómito. Llame a un médico inmediatamente. En todos los casos mostrar la etiqueta del producto al médico.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Almacenamiento:

Almacene el cebo en un lugar seco y aireado, pero cerrado, donde no se almacenen alimentos, bebidas, medicamentos u objetos personales. Guárdelo en el envase original y lejos del alcance de los niños. Protéjalo del calor, luz y humedad.

Formula:

Principio activo: Bromadiolona..... 0.005g.
Benzoato de denatonio 0.001g.

Notificación sanitaria: 84-PLE-0222

EPA Est. #: 87235-GBR-001

FABRICADO POR:

PelGar International Ltd. Unit 13 Newman Lane, Alton Hampshire, GU34 2QR. UK.

Distribuido por: LUGUISA S.A. GUAYAQUIL-ECUADOR.