



TRIVIA®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP).

INGREDIENTE ACTIVO: Propineb + Fluopicolide.

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: TRIVIA® es un polvo mojable (WP) que contiene 667 g de Propineb + 60 g de Fluopicolide por kg de producto comercial.

ACCIÓN FITOSANITARIA: TRIVIA® protege por fuera y cura por dentro de la hoja, combate la lancha antes y después de establecida. No afecta la fotosíntesis por su coloración blanca. Su parte protectante se adhiere mejor a la hoja. No se acumula dentro de la planta, presentando una mejor dispersión en la hoja. En invierno presenta su máxima potencia.

MODO DE ACCIÓN: TRIVIA® es un fungicida preventivo-curativo por las características que le dan sus ingredientes activos.

MECANISMO DE ACCIÓN: Propineb es un inhibidor multisitio y Fluopicolide con acción en proteínas específicas, es esencial en las interacciones con la membrana celular.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Se recomienda la aplicación de TRIVIA® con base en los resultados del monitoreo de las diferentes enfermedades. TRIVIA® debe ser aplicado dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, siguiendo las recomendaciones de Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas FRAC y complementando con prácticas de manejo integrado de cultivo.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Estados iniciales de cultivo: 1 funda de 400 g por tanque de 200 litros. Comienzo de lluvias: 2 fundas de 400 g por tanque de 200 litros.

- Para conseguir una buena mezcla se debe diluir la dosis recomendada en un poco de agua hasta conseguir una suspensión homogénea.

- Vertir esta premezcla en el tanque del equipo que va a utilizarse, con la cantidad de agua necesaria. No deje de agitar el contenido.

COMPATIBILIDAD DE MEZCLA: Antes de realizar mezclas se recomienda realizar previamente pruebas de fitocompatibilidad con el producto que se desea mezclar.

COMPATIBILIDAD CON EL CULTIVO: TRIVIA® en las dosis y frecuencia recomendadas, es compatible con los cultivos registrados, sin embargo, se recomienda pruebas de fitocompatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos.

PRECAUCIONES: Almacene el producto fuera del alcance de los niños, bajo llave, en un sitio seguro, fresco, seco y bien ventilado, separado de alimentos y drogas de consumo humano o animal, ropa, calzado y utensilios del hogar.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta. En caso de ingestión no induzca el vómito si el paciente está consciente. Mientras consigue asistencia médica, suministre al paciente los primeros auxilios generales.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: II. Moderadamente peligroso.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) ATENCIÓN las 24 horas del día. Para mayor información contactarse con oficinas de Bayer: 023975200 - 0985524044.

REGISTRO AGROCALIDAD: 161-F1/NA

RECOMENDACIONES DE USO:

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS (kg/ha)	PC (Periodo de Carencia)
PAPA <i>Solanum tuberosum</i>	Lancha <i>Phytophthora infestans</i>	1.5	14
UVA <i>Vitis vinífera L.</i>	MILDIU <i>Plasmopara viticola</i>	*1.5	30

* Uva dosis equivalente a 0.25% con un gasto de agua de 600l/ha.
Papa volumen de agua mínimo de 400 l/ha

Bayer S.A.
Calle Luxemburgo N34-359 y Portugal, Edificio Cosmopolitan piso 6
Quito - Ecuador

Tel +593 (2) 3975200
Línea de Servicio al Cliente 1800-2293772
www.bayerandina.com