

# Foltron Plus

## Fertilizante foliar Suspensión acuosa

### COMPOSICION PORCENTUAL

Ingredientes activos:	Porcentaje en peso
Nitrógeno amoniacal	10%
Fósforo P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	20%
Potasio K <sub>2</sub> O	5%
<b>Elementos menores:</b>	
Fierro y Zinc metálicos	500ppm
Magnesio y Manganeso	100ppm
Boro	80ppm
Cobre	50ppm
Molibdeno	2ppm
Giberelinas	30ppm
Folcisteína	2,750ppm
Acido húmico	7,800ppm



### INFORMACION GENERAL

FOLTRON PLUS es un fertilizante foliar líquido de alta concentración, suplemento adicional al programa normal de fertilización. FOLTRON PLUS es un producto que tiene una formulación de elementos mayores 10-20-5 y esta adiconado con elementos menores, hormonas vegetales, folcisteína y ácidos húmicos. FOLTRON PLUS corrige deficiencias nutricionales en las plantas y evita la caída de botones, cuadros, flores y frutos.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

FOLTRON PLUS está catalogado como un producto no tóxico para humanos ni animales, sin embargo, se recomienda observar las precauciones normales antes de su aplicación como por ejemplo: no ingerir el producto y lavarse las manos y bañarse con abundante agua y jabón.

### MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

### INSTRUCCIONES DE USO:

Siempre calibre el equipo de aplicación.

Cultivo	Dosis	Epoca de Aplicacion	Observaciones
Afalfa	2-3 L/ha	10-15 días después del corte. ASEGURESE DE QUE LA CANTIDAD DE AGUA SEA	

		PARA DAR UN BUEN CUBRIMIENTO	
Algodón	2-3 L/ha Inicio de la floración	Inicio del cuadro. Inicio de la floración	
Cereales (trigo, cebada, avena, arroz, etc.)	3 L/ha	Al inicio del embuche. En grano lechoso	
Fresa	2 L/ha	15 días después del trasplante, al inicio de la floración y en fruto verde.	
Frutales (manzano, durazno, nogal, cítricos)	350 cc / 100 L de agua	Al inicio de la floración, frutos pequeños y frutos en desarrollo.	
Frijol y soya	2-3 L/ha	A los 30 días después de la siembra, repetir cada 21 días	
Maíz y sorgo	2-3 L/ha	A los 30 cm de altura de las plantas, repetir cada 21 días 2 ó 3 veces más	
Papa	3 L/ha	A los 30 cm de altura, repetir cada 21 días 2 ó 3 veces más. ASEGURESE DE QUE LA CANTIDAD DE AGUA SEA PARA DAR UN BUEN CUBRIMIENTO	
Tomate, chile y hortalizas	2-3 L/ha	15 días después del trasplante, repetir cada 21 días hasta fruto en desarrollo	
Cultivos en general	3 L/ha	Foliar durante el período de crecimiento y floración	

**PRIMEROS AUXILIOS:**

En caso de ingestión accidental inducir el vómito y llamar a un médico. En caso de contacto con la piel u ojos deberá lavarse la parte afectada con abundante agua limpia y jabón, inmediatamente después buscar atención médica.

**RECOMENDACIONES AL PUBLICO:**

FOLTRON PLUS es un nutriente foliar, no tóxico, pero en caso de ingestión provoque el vómito dándole un vaso de agua tibia agregando una cucharada de sal y llame al médico. Almacénese en lugares frescos y ventilados y evite lugares con temperaturas mayores de 40°C y no estibe más de 3 cubetas una sobre otra, para mejor conservación de los envases.

**AVISO DE GARANTIA:**

El fabricante garantiza el contenido de los compuestos en la garantía de composición de la etiqueta. Fabricante y vendedor limitan su responsabilidad a la reposición del producto defectuoso; no se responsabilizan por el daño o pérdida que directa o indirectamente pueda ocasionarle el mal uso del producto.