





# Basfoliar<sup>®</sup> Boro SL

## DESCRIPCIÓN

- **Basfoliar<sup>®</sup> Boro SL** es un Poliborato, formulado como Concentrado Soluble.
- **Basfoliar<sup>®</sup> Boro SL** es un producto con: calidad y pureza, por lo tanto es muy seguro para el cultivo.
- **Basfoliar<sup>®</sup> Boro SL** es un producto de alta concentración, especialmente adecuado para la corrección de deficiencias de Boro.
- **Basfoliar<sup>®</sup> Boro SL** contiene surfactantes para mejorar la compatibilidad con productos fitosanitarios y obtener un mejor mojamiento .

## Especies más afectadas por deficiencias de Boro:

- |           |             |             |            |              |
|-----------|-------------|-------------|------------|--------------|
| ▪ Manzana | ▪ Apio      | ▪ Almendra  | ▪ Coliflor | ▪ Nabo       |
| ▪ Pera    | ▪ Espárrago | ▪ Vid       | ▪ Brócoli  | ▪ Clavel     |
| ▪ Ciruela | ▪ Alfalfa   | ▪ Olivo     | ▪ Sandía   | ▪ Pino       |
| ▪ Durazno | ▪ Girasol   | ▪ Remolacha | ▪ Melón    | ▪ Eucaliptus |



# Basfoliar® Boro SL

## Recomendaciones de Uso:

Cultivo	Aplicación por hectárea	N° de aplicaciones	Aplicación
Pomáceas	2,5 – 4 L	2	Desde rama verde hasta comienzo de la floración. En post-cosecha con hojas verdes y activas
Almendro, ciruelo, cerezo y duraznero	2,5 – 4 L	2	Brote floral. En post-cosecha con hojas verdes y activas
Vid y uva de mesa (con semillas)	4,5 – 12 L	2	15 días antes de la floración y al comienzo de la floración
Kiwi	2 – 3 L	1	Antes de floración
Paltos	2 – 3 L	2	A exposición de panícula. Variedad fuerte, solo aplicar 90-100 ml/100L.
Rosas	2,5 – 4 L	1	Pre-floración
Claveles	4,5 – 6 L	3	Pre-floración 40-60-80 días después de germinación
Alfalfa	4,5 – 9,5 L	1	Después del corte o pre-floración (semilleros).
Remolacha	4,5 – 9,5 L	1	Desde 8 hojas en adelante
Trigo	2,5 – 4,5 L	1	Hoja bandera, emergencia de espiga antes de la antesis, sólo en suelos con < 0.8 ppm de B
Maíz	2,5 – 4,5 L	1	Pre-floración
Girasol	2,5 – 4,5 L	2	1°: Estado estrella 2°: Comienzo de flor
Nabo	2,5 – 4,5 L	2	1°: Estado de roseta 2°: Comienzo floración
Broccoli, coliflor	5 – 9 L	1-2	Antes del comienzo de la formación de cabeza, cada 7 días.
Apio	5 – 9 L	1	40 días después de germinación
Tomate, pimiento	2,5 – 5 L	1-2	Antes de la cuaja del 2° racimo, con primeras flores abiertas
Melon, Sandía	5 – 9 L	1	Antes de floración



Precisión Alemana  
en Nutrición Vegetal

# Basfoliar® Boro SL

## PRECAUCIONES

**Basfoliar® Boro SL** es un producto ecológicamente compatible, biodegradable en el medio ambiente y no tiene restricciones de carencia.

**Basfoliar® Boro SL** es considerado no tóxico para las plantas y animales. Por lo tanto, para el manejo del producto es necesario atenerse a las precauciones de uso de los productos fitosanitarios con los que haya sido **Basfoliar® Boro SL**.

**Basfoliar®** es marca registrada de COMPO Alemania