



Fertilizante foliar alto en fósforo Cristales solubles

COMPOSICION PORCENTUAL	
Ingredientes activos	Porcentaje en peso
Nitrógeno total	12.00%
Fósforo disponible	60.00%



INFORMACION GENERAL

SUPERFOS 12 60 0 es un fertilizante foliar con alta concentración de fósforo, elemento de gran importancia para la nutrición de las plantas en todas las etapas de su desarrollo, principalmente en la floración, fructificación y desarrollo de frutos y semillas.

INSTRUCCIONES DE USO

SUPERFOS 12-60-0 se aplica por aspersion en suficiente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento del follaje, se puede aplicar con equipo terrestre o aéreo.

SUPERFOS 12-60-0 es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares de uso común.

SUPERFOS 12-60-0 sólido de cristales altamente solubles contiene ingredientes de compatibilidad, además de agentes penetrantes que hacen de SUPERFOS 12-60-0 un fertilizante foliar de rápida penetración al interior de las plantas. SUPERFOS 12-60-0 contribuye a un mayor amarre de la floración, así como también lograr un buen desarrollo y madurez de frutos y semillas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

SUPERFOS 12 60 0 es un producto de baja toxicidad, se recomienda observar las precauciones básicas que se emplean para el uso de este tipo de productos.

AVISO DE GARANTIA

Fabricante y vendedor limitan su responsabilidad a la reposición del producto

defectuoso. Ni el fabricante ni el vendedor pueden responsabilizarse por daño, o pérdida que directa o indirectamente pueda ocasionar el mal uso del producto. Cualquier otra garantía expresa o implícita que no sea otorgada por escrito por el fabricante carece de validez.

Cultivo	Dosis	Epoca de Aplicación
Frijol y soya	1.5-2.5 kg/ha	2 a 3 aplicaciones durante la formación de vainas
Café	3-4 kg/ha	Aplique durante la floración y formación de la cereza, use la dosis alta si planea una sola aplicación
Algodonero	1.5-3 kg/ha	Aplique durante la formación de los cuadros, al inicio de la floración y durante la formación de bellotas.
Invernaderos y viveros (flores de ornato y plántulas de hortalizas)	2-4 kg/ha	Aplique al inicio de la floración, úsense las dosis altas cuando la superficie foliae sea pequeña, o cuando se efectúe una sola aplicación en el ciclo.
Plátano y árboles frutales	3-4 kg/ha	Aplicar al inicio de la floración y dos aplicaciones durante la formación del fruto.
Arroz	2 kg/ha	Aplique iniciando el primordio floral.
Trigo, centeno, avena, maíz y sorgo	1-2 kg/ha	Aplique antes de que se inicie la floración.
Fresa	1.5-2.5 kg/ha	Efectuar una primera aplicación al inicio de la floración, una segunda cuando hayan frutos verdes y posteriormente después de cada corte.
Tomate, papa, chile y hortalizas	1.5-3 kg/ha	Aplique cada 8 a 10 días en los periodos de floración y fructificación.
Melón, pepino, sandía y calabaza	1.5-3 kg/ha	Aplique cada dos semanas durante la floración.