

160mm

Área de pegado

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Precauciones y advertencias de uso y aplicación: "Dañino si se ingiere. "Dañino si se absorbe a través de la piel. "Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. "Evite respirar los vapores de aspersión. "Evite aspirar (polvo, vapor o aspersión). "Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. "Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Medidas relativas a la seguridad: "No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. "Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación (use guantes, botas, overol de dos piezas y careta de protección), y para ingresar al área tratada. "Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

"EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"

Almacenamiento y manejo del producto: "Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas, para consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). "Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. "No almacenar en sitios de habitación. "No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje o alimentos para animales. "No almacenar a temperaturas mayores a 40 °C por más de seis meses o con ocurrencia de picos de temperatura mayores a 54 °C durante más de dos semanas. "No re-ensavar o almacenar el contenido de pesticidas en envases diferentes a su empaque original.

Medidas relativas a primeros auxilios: En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y percíbrese de que respira sin dificultad. Consulte a un médico si es necesario. En caso de contacto con la piel, retirese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. Consulte a un médico si es necesario. En caso de contacto con los ojos, si entra en contacto con los ojos, enjuague con agua por 25 minutos. Consulte a un médico si es necesario. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Consulte a un médico si es necesario. **Instrucciones para el tratamiento médico:** No existe un antídoto específico. Su tratamiento es sintomático.

"En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa adjunta".



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día
DuPont de Ecuador Tel. 02-250-8751 Ext.114**

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos: "Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse para contener alimentos o agua para consumo. "Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin o en el centro de acopio de campo limpio. "En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Medidas relativas para la protección del ambiente: "Este producto es tóxico para las abejas expuestas al tratamiento directo de los cultivos en etapa de floración. No aplique este producto o permita que la deriva del mismo pase a los cultivos en etapa de floración o malezas cuando las abejas estén activamente visitando el área de tratamiento. "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. "No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. "Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. "No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo. "No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión desde las áreas tratadas.

Verimark®

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:

Cytraniliprole:..... 200 g/l

Aditivos:..... C.S.P. 11

Registro Nacional No.

CONTENIDO NETO: 1 litro

Lote Nº:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

PVP:

Titular del Registro: DuPont de Ecuador S. A.
Av. 6 de Diciembre 2816 y Paúl Rivet Tel. 02-250-8751 Ext.114

Formulado por:

E.I. du Pont de Nemours and Company

Valdosta Manufacturing Center

2509 Rocky Ford Road

Valdosta, GA 31601, USA



Distribuido por:

© Marca Registrada de E.I. du Pont de Nemours and Company

Instrucciones de uso y manejo: Verimark® es un insecticida formulado en forma de suspensión concentrada (SC) que se aplica en el suelo alrededor de las raíces de las plantas tratadas. Verimark® es un producto insecticida de espectro cruzado (controla especies seleccionadas de diferentes órdenes al tiempo que presenta un riesgo mínimo a los artrópodos beneficios). Actúa principalmente por ingestión, pero también tiene actividad por contacto. Verimark® debe ser aplicado en las etapas iniciales del ciclo del cultivo, en el sitio definitivo donde se siembren las plántulas, cuando las poblaciones de insectos sean bajas.

Modo de empleo: Llene el tanque de la mezcla a ¾ o ½ de su capacidad con agua. Agregue la cantidad de Verimark® que se vaya a utilizar. Complete el volumen de agua y agite bien hasta conseguir que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla periódicamente y cada vez que vaya a llenar el equipo de aplicación previamente calibrado. Mantenga el equipo utilizado para la aplicación limpio y en buenas condiciones, cuidando que no se produzcan escapes ni contaminación externa.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"
"AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR"**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (1) (cc/ha)	P.C. (Período de Carencia)
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill)	Gusano Tierrero (<i>Agrotis ipsilon</i> Hufnagel)	350	1 (días)
	Minador de las hojas (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	200	
	Gusano Enrollador de la hoja (<i>Tuta absoluta</i>)	400	
Pimiento (<i>Capsicum annum</i>)	Gusano tierrero (<i>Agrotis ipsilon</i> Hufnagel)	350	
Brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> subvar. <i>cymosa</i>)	Áfidos (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	500	
	Plutella (<i>Plutella xylostela</i>)	250	

Época y Frecuencia de Aplicación:

Tomate: Verimark® controla de manera efectiva las plagas especificadas en esta etiqueta, con la misma aplicación. No se requiere realizar aplicaciones por separado para cada tipo de plaga. En caso de que la aplicación sea dirigida a una plaga en particular, utilice la dosis específica de acuerdo a la tabla de recomendaciones. Para maximizar los beneficios de Verimark® en las plantas de tomate, se recomienda el siguiente orden de las aplicaciones:

- Realice la primera aplicación de Verimark® con una dosis de 350 cc/ha el primer día de la siembra para controlar Gusano tierrero (*Agrotis ipsilon* Hufnagel), Minador de las hojas (*Liriomyza huidobrensis*) y los ataques iniciales de Gusano Enrollador de la hoja (*Tuta absoluta*).
- Realice una segunda aplicación de Verimark® con una dosis de 400 cc/ha entre 14 a 18 días después de la primera aplicación para controlar Gusano Enrollador de la hoja (*Tuta absoluta*).

Pimiento: Realice una única aplicación de Verimark® con una dosis de 350 cc/ha el primer día de la siembra para controlar Gusano tierrero (*Agrotis ipsilon* Hufnagel).

Brócoli: Para controlar plutella (*Plutella xylostela*) realice una aplicación de Verimark® de 15 a 20 días después de la siembra con una dosis de 250 cc/ha y repita la aplicación de 14 a 21 días después, dependiendo de la presión de la plaga. Comience las aplicaciones cuando observe a los insectos adultos volando alrededor de las plantas o cuando encuentre por lo menos dos larvas de primer estadio en 10 plantas analizadas. No realice aplicaciones de Verimark® con infestaciones altas de plutella ya establecidas en los cultivos. Para control de Áfidos (*Brevicoryne brassicae*), realice una aplicación de Verimark® 20 días después de la siembra con una dosis de 500 cc/ha y repita la aplicación 14 días después.

Período de reingreso: 12 horas después de la aplicación.

Compatibilidad y fitotoxicidad: (VER HOJA INFORMATIVA ADJUNTA)

Responsabilidad: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, siempre y cuando se use y maneje de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí suministradas."

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III - LIGERAMENTE PELIGROSO



CUIDADO



288mm



Ficha Técnica para etiqueta DuPont, información clasificada.

Descripción del Layout:

Etiqueta Couche Adhesivo, impresión en Off-Set, para presentación de botella de 1Lt.

Medidas: Milímetros.

Alto:

160mm

Largo:

288mm

Tolerancia:

1mm +/-

Fecha de Revisión:

18/sep/2014

País:

Ecuador

Colores:

PMS: Rojo186, Verimark 325, Azul 293, Black 100%

Código A Vigente:

Razón de Cambio:

Cotas:

Línea de corte

Línea de área de texto

Área de pegado

Código A Obsoleto:

**AJUSTE MODELO
ETIQUETA ECUADOR**
(tamaño de la fuente +6pto)