



Knowledge grows

# YaraVita™ ZINTRAC 700™

## Suspensión concentrada

Zinc (Zn) 70% p/v 700 g/l

Cultivo	Dosis l/ha	Momento de aplicación
Arroz	1	Al inicio del macollamiento y al inicio de formación de la panícula. Volumen mínimo de agua: 50 l/ha.
Banana	De 0.3 a 1	Se puede repetir frecuentemente en caso de necesidad (se recomienda aplicar en intervalos mínimos de 7 días para mayor eficacia). Volumen mínimo de agua: 30 l/ha.
Maíz	De 0.3 a 1	Cuando el cultivo tenga de 3 a 8 hojas. Con deficiencias severas es posible repetir a la misma dosis en intervalos de 10-14 días. Volumen mínimo de agua: 30 l/ha.
Rosas de corte (en campo)	0.3	3 aplicaciones a 8, 15 y 25 días después del nuevo brote. Volumen mínimo de agua: 400 l/ha.
Caña de azúcar	1	Aplicar cuando la caña mida entre 30 y 120 cm de altura. Se puede repetir en caso de necesidad en intervalos de 10-14 días. Volumen mínimo de agua: 30 l/ha.

## ¿Por qué aplicar foliarmente?

Porque el suministro de nutrientes vía foliar garantiza la precisa aplicación de elementos requeridos, en el momento indicado. Puede adaptarse a las necesidades inmediatas del cultivo y evitar las eventuales interferencias o pérdidas de las aplicaciones al suelo.

El Zinc es catalizador de procesos enzimáticos para la síntesis de proteínas y metabolismo de carbohidratos. Es vital en la regulación de los principales procesos de crecimiento a través de su participación en la síntesis de auxinas de la planta.



## Beneficios de YaraVita™ ZINTRAC 700™

- Elaborado bajo estrictos procedimientos de calidad.
- Fácil aplicación y absorción.
- Mezclable en el tanque con una amplia gama de productos fitosanitarios. Para más información visite: [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com)
- Materias primas controladas y aprobadas por la normativa europea.
- Formulado bajo estrictas normas de calidad ISO 9001.

