

GEBRUIKSAANWIJZING / RECOMMENDED USE / USAGE

**NL - 1x/dag 3 capsules bij de hoofdmaaltijd.** Te bewaren op een droge en koele plaats, buiten het bereik van kinderen. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Een voedingssupplement kan een evenwichtige voeding of een gezonde levensstijl niet vervangen. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 6 jaar. Niet gebruiken tijdens zwangerschap/borstvoeding.

**EN - 1x/day 3 capsules with the main meal.** Store in a dry and cool place, out of the reach of children. Do not exceed the recommended daily dose. A dietary supplement cannot replace a balanced diet or a healthy lifestyle. Do not administer to children under 6 years of age. Do not use while pregnant/breastfeeding.

**FR - 1x/jour 3 capsules pendant le repas.** Conserver dans un endroit sec et frais, hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Un complément alimentaire ne peut se substituer à une alimentation équilibrée ou à un mode de vie sain. Ne pas administrer aux enfants de moins de 6 ans. Ne pas utiliser pendant la grossesse/l'allaitement.

Lot n° / Batch n° / Tenminste houdbaar  
tot einde / Best before end / A consommer  
de préférence avant fin:  
zie deksel / see lid / voir couvercle

Distributeur / Distributor:  
Tyranos  
Luikersteenweg 208  
3500 Hasselt, Belgium



# Tyranos®

## ACTIVE\*

VOOR KRAAKBEEN\*  
FOR CARTILAGE\*

Voedingssupplement  
**90 CAPSULES (78g)**

INGREDIENTEN / INGREDIENTS

Glucosamine sulfaat / sulfate (**Crustaceans**), boswellia serrata extract (Boswellia serrata L), coating: gelatin(e) capsule, antiklontermiddel / anti-caking agent: siliciumdioxide / silicon dioxide, vitamin(e) C, collage(e)n (kip/chicken), antiklontermiddel / anti-caking agent: magnesium stearaat / stearate, vitamin(e) D3.

**Per dagdosis / Per daily intake (3 capsules)**

Boswellia serrata extract	450 mg
waarvan / of which AKBA	135 mg
Glucosamine sulfaat/sulfate	1500 mg
waarvan / of which glucosamine	1065 mg
Collavant® n2 collage(e)n type II (natief/native)	40 mg
Vitamin(e) C	50 mg (62,5% RI°)
Vitamin(e) D3	20 µg (400% RI°)

°Referentie inname / Reference intake

[www.tyranos.eu](http://www.tyranos.eu)

\* Vitamine C draagt bij tot de normale vorming van collageen voor de normale werking van kraakbeen en draagt bij tot een normaal energie metabolisme.

\*Vitamin C contributes to the normal formation of collagen for the normal function of cartilage and contributes to normal energy metabolism.