

GEBRUIKSAANWIJZING / RECOMMENDED USE / USAGE

NL - 2 tabletten bij het ontbijt en 1 tablet bij het avondmaal. Te bewaren op een droge en koele plaats, buiten het bereik van kinderen. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Een voedingssupplement kan een evenwichtige voeding of een gezonde levensstijl niet vervangen. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 6 jaar. Niet gebruiken tijdens zwangerschap/borstvoeding. Raadpleeg een arts als u anticoagulantia gebruikt.

EN - 2 tablets with breakfast and 1 tablet with dinner. Store in a dry and cool place, out of the reach of children. Do not exceed the recommended daily dose. A dietary supplement cannot replace a balanced diet or a healthy lifestyle. Do not administer to children under 6 years of age. Do not use while pregnant/breastfeeding. Consult a health professional if you are taking anticoagulants.

FR - 2 comprimés au petit déjeuner et 1 comprimé au dîner. Conserver dans un endroit sec et frais, hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Un complément alimentaire ne peut substituer à une alimentation équilibrée ou à un mode de vie sain. Ne pas administrer aux enfants de moins de 6 ans. Ne pas utiliser pendant la grossesse/l'allaitement. Consultez un médecin si vous prenez des anticoagulants.

Lot n° / Batch n° / Tenminste houdbaar tot einde / Best before end / A consommer de préférence avant fin: zie deksel / see lid / voir couvercle

www.tyranos.eu

Distributeur / Distributor:
Tyranos
Luikersteenweg 208
3500 Hasselt, Belgium



Tyranos®

ACTIVE **plus+***

VOOR KRAAKBEEN & SOEPELE GEWRICHTEN*
FOR CARTILAGE & FLEXIBLE JOINTS*

Voedingssupplement
90 tabletten (103g)

INGREDIËNTEN / INGREDIENTS

Glucosamine sulfaat / sulfate (**Schaaldieren/ Crustaceans**), curcuma longa extract (Curcuma longa L), boswellia serrata extract (Boswellia serrata L), vulstof / bulking agent: microkristallijne cellulose microcrystalline, vitamin(e) C, antilontermiddelen / anti-caking agents: siliciumdioxide / silicon dioxide, mono- en diglyceriden van vetzuren / mono- and diglycerides of fatty acids, collage(e)n (kip/chicken), antilontermiddel / anti-caking agent: magnesium stearaat / stearate, vitamin(e) D3. **Per dagdosis / Per daily intake (3 tabletten/tablets)**

Boswellia serrata extract	400 mg
waarvan / of which AKBA	120 mg
BCM-95® curcuma extract	1000 mg
waarvan / of which curcuminoides complex	950 mg
Glucosamine sulfaat / sulfate	1500 mg
waarvan / of wich glucosamine	1065 mg
Collavant® n2 collage(e)n type II (natief/native)	40 mg
Vitamin(e) C	50 mg (62,5% RI°)
Vitamin(e) D3	20 µg (400% RI°)

°Referentie inname / Reference intake

* Curcuma en Boswellia helpen soepele gewrichten te behouden. Curcuma and Boswellia help to maintain flexible joints. Vitamine C draagt bij tot de normale vorming van collageen voor de werking van kraakbeen en draagt bij tot een normaal energie metabolisme. Vitamin C contributes to the normal formation of collagen for the normal function of cartilage and contributes to normal energy metabolism.