

Medium 199 (M199) (2X), LIQUID

With L-glutamine
With sodium bicarbonate

Catalog Number **LM 202-50** (with Earle's salts)
Equal to **LM006-01** at 1X)
LM 202-51 (with Hanks' salts)
Equal to **LM006-06** at 1X)

Storage Temperature 2~8°C

제품설명

Medium 199에는 매우 다양한 종류의 비타민, 아미노산, 그리고 그 외의 여러 인자들이 포함되어 있다. Medium 199은 매우 다양한 종류의 세포 배양에 적용할 수 있으며 특히 형질전환 되지 않은 세포 배양에 적합하다. 1950년대 Morgan 등에 의해 무혈청 배지로 개발되었으나 장기간 배양하기 위해서는 혈청을 첨가하는 것이 좋다는 결과가 보고되기도 하였다. 현재 Medium 199은 바이러스 연구, 백신 생산, 그리고 mouse의 췌장 상피조직과 rat의 수정체 조직의 초대 배양(primary explants) 등에 널리 사용된다.

LM 202-50은 Earle's balanced salts를 기본조성으로 하고, 200 mg/L의 L-glutamine과 4400 mg/L의 sodium bicarbonate이 포함되어 있다. **LM 202-51**은 Hanks' balanced salts를 기본조성으로 하고, 200 mg/L의 L-glutamine과 700mg/L의 sodium bicarbonate이 포함되어 있다. 적절한 배양액을 선택하기 위해서는 (1) 배양할 세포 종류, (2) 배양방법 (monolayer, suspension, or clonal), 그리고 (3) 필수 성분 포함 여부 등을 고려해야 한다. 또한 참고문헌을 기초로 하여 배양액에 혈청, 첨가물, 그리고 기타 물리적 조건 등을 최적화함으로써 배양하고자 하는 세포의 성장 및 목적 산물의 생산을 최적화할 수 있다.

보관 및 안정성

액상 배지는 차광하여 2~8°C에서 보관하여야 한다. 액상 배지의 변성은 (1) 침전물 또는 부유물, (2) 용액의 탁해짐, (3) 색의 변화, 그리고 (4) pH의 변화 등으로 나타날 수 있다. 추가로 첨가하는 첨가제의 성질에 의해 보관조건 및 배지의 유효기간이 바뀔 수 있다. 유효기간은 제품 라벨에 표시되어 있다.

생물학적 특성

Medium 199의 세포 증식 능력은 1X의 액상 배지에 적합한 세포주를 배양하면서 시험한다. 성장 속도는 세 번의 계대 배양을 통하여 측정하고 표준품에서 배양한 것과 비교한다. 시간에 따른 세포수의 변화를 측정하고 seeding efficiency, doubling time, 그리고 최종 세포농도를 결정한다. 시험을 하면서 현미경으로 세포의 형태 변화와 cytotoxicity의 현상이 나타나는지 관찰한다.

사용방법 (1 L의 1X medium 제조방법)

- 400 ml의 세포배양용 물 (**LS 016-01**)을 적당한 용기에 담고 500 ml의 2X Medium 199을 첨가하여 잘 섞어준다.
- 아래 표에 기록된 pH 이외의 pH를 원하는 경우 멸균된 1 N HCl (**LS 003-02**) 또는 1 N NaOH (**LS 012-02**)로 pH를 맞춘다.
- 세포배양용 물로 최종 부피 1 L를 맞춘다.

Product Profile	LM 202-50	LM 202-51
Appearance	Red transparent solution	Red transparent solution
pH at RT	7.0 ~ 7.6 w/ NaHCO ₃	7.0 ~ 7.6 w/ NaHCO ₃
Osmolality*	274~302 Osm/kgH ₂ O	275~303 Osm/kgH ₂ O
Endotoxin	≤ 1.0 EU/ml	≤ 1.0 EU/ml
Sterility	Sterilized by 0.2 μm filtration system. Sterility tests are performed in accordance with protocols described in USP.	

* Osmolality at 1X concentration

주의

For In Vitro Use Only

Components	LM 202-50	LM 202-51
CaCl ₂ (anhydrous)	400.00	280.00
Fe(NO ₃) ₃ ·9H ₂ O	1.44	1.44
KCl	800.00	800.00
KH ₂ PO ₄	-	120.00
MgSO ₄ (anhydrous)	196.00	196.00
NaCl	13600.00	16000.00
NaHCO ₃	4400.00	700.00
NaH ₂ PO ₄ ·H ₂ O	240.00	-
Na ₂ HPO ₄ ·7H ₂ O	-	180.00
Adenine Sulfate	20.00	20.00
Adenosine-5-triphosphate	2.00	2.00
Adenosine-5-phosphate	0.40	0.40
Cholesterol	0.40	0.40
2-deoxy-D-ribose	1.00	1.00
D-Glucose	2000.00	2000.00
Glutathione (reduced)	0.10	0.10
Guanine·HCl	0.60	0.60
Hypoxanthine·Na	0.80	0.80
Phenol Red	40.00	40.00
Ribose	1.00	1.00
Sodium Acetate	100.00	100.00
Thymine	0.60	0.60
Tween 80	40.00	40.00
Uracil	0.60	0.60
Xanthine·Na	0.68	0.68
L-Alanine	50.00	50.00
L-Arginine·HCl	140.00	140.00
L-Aspartic Acid	60.00	60.00
L-Cysteine·HCl·H ₂ O	0.20	0.20
L-Cystine·2HCl	52.00	52.00
L-Glutamic Acid	150.00	150.00
L-Glutamine	200.00	200.00
Glycine	100.00	100.00
L-Histidine·HCl·H ₂ O	44.00	44.00
L-Hydroxyproline	20.00	20.00
L-Isoleucine	80.00	80.00
L-Leucine	120.00	120.00
L-Lysine·HCl	140.00	140.00
L-Methionine	30.00	30.00
L-Phenylalanine	50.00	50.00
L-Proline	80.00	80.00
L-Serine	50.00	50.00
L-Threonine	60.00	60.00
L-Tryptophan	20.00	20.00
L-Tyrosine·2Na·2H ₂ O	116.00	116.00
L-Valine	50.00	50.00
Ascorbic Acid	0.10	0.10
α-Tocopherol Phosphate (sodium salt)	0.02	0.02
Biotin	0.02	0.02
Calciferol	0.20	0.20
D-Ca Pantothenate	0.02	0.02
Choline Chloride	1.00	1.00
Folic Acid	0.02	0.02
i-Inositol	0.10	0.10
Menadione (sodium bisulfite)	0.02	0.02
Niacin	0.05	0.05
Niacinamide	0.05	0.05
Para-aminobenzoic Acid	0.10	0.10
Pyridoxal·HCl	0.05	0.05
Pyridoxine·HCl	0.05	0.05
Riboflavin	0.02	0.02
Thiamine·HCl	0.02	0.02
Vitamin A (acetate)	0.28	0.28

참고문헌

Morgan, J.F., Morton, H.J. and Parker, R.C. (1950). The Nutrition of Animal Cells in Tissue Culture. I. Initial Studies on a Synthetic Medium. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 73, 1-8.
Morgan, J.F., Campbell, E. and Morton, H.J. (1955). The Nutrition of Animal Tissues Cultivated In Vitro. I. A Survey of Natural Materials as Supplements to Synthetic Medium. J.N.C.I. 16:2, 557-567.
Morton, H.J. (1970). A Survey of Commercially Available Tissue Culture Media. In Vitro. 6, 89-108.
Rutzky, L.P. and Pumper, R.W., (1974). Supplement to a Survey of Commercially Available Tissue Culture Media (1970). In Vitro. 9, 468-469.