

Wijzigingen Pocket Dermatologie | 3^e (herziene) druk

Pagina	Afbeelding, tabel	Aandoening, titel	Tussenkop	Oud	Nieuw
					Bij de herziening van de pocket Dermatologie zijn afbeeldingen en weetjes toegevoegd die helpen bij het herkennen van huidaandoeningen op verschillende huidtypen. Daarnaast zijn de beschrijvingen volgens PROVOKE uitgebreid en de aandoeningen Pityriasis versicolor en Vitiligo toegevoegd.
66			Immunosuppressiva	Bij de behandeling van o.a. psoriasis kan gebruikgemaakt worden van selectieve immunosuppressiva.	Bij de behandeling van o.a. psoriasis kan worden gekozen voor systemische therapie met immunosuppressiva, zoals methotrexaat en ciclosporine.
117		Erytheem	Gegeneraliseerd erytheem		Verwijderd: Zenuwvlekken
122		Acne vulgaris			Toegevoegd bij [B]: ☞ Een combinatie van twee topicale middelen gedurende 12 wkn is effectiever dan monotherapie, de combinatie wordt bepaald door ernst acne en voorkeur patiënt
125		Hidradenitis suppurativa		[AO] Kweek t.u.v. bacteriële infectie met stafylokokken	[AO] Klinische diagnose, evt. kweek t.u.v. bacteriële infectie met stafylokokken of biopt t.u.v. andere aandoeningen
125		Hidradenitis suppurativa			Toegevoegd bij [B]: ☞ Analgeticum bij pijnklachten
126		Rosacea		[O] Idiopathisch	[O] Genetische aanleg: disregulatie immuunrespons en neurovasculaire disfunctie
126		Rosacea			Toegevoegd bij [R]: ♀
126		Rosacea			Toegevoegd bij [A]: oogklachten
126		Rosacea		[!] ... 50% van de mensen met rosacea heeft oculaire klachten ...	[!] ... 2/3 van de mensen met rosacea heeft oculaire klachten ...
129		Furunkel en karbunkel			Toegevoegd bij [LO] [R] confluerend (karbunkel)
129		Furunkel en karbunkel		[LO] [E] Verheven erythemateuze laesie met soms centraal een pustel	[LO] [E] Verheven erythemateuze erosie met soms centrale necrose en pussige afvoer
130		Impetigo vulgaris		[LO] [R] Confluerend	[LO] [R] Solitair of confluerend
130		Impetigo vulgaris		[LO] [E] Erythemateuze maculae	[LO] [E] Erythemateuze papels en plaques
132		Bulleus pemfigoïd			Toegevoegd bij [LO] [E]: urticariële plaques
133		Dermatitis herpetiformis		[R] ... kaukasisch ...	[R] ... Noord-Europese afkomst ...

Wijzigingen Pocket Dermatologie | 3^e (herziene) druk

135		Pemphigus vulgaris			Toegevoegd bij [B]: rituximab
140					Toegevoegd: Regel van 9 bij kinderen tot 9 jaar: <ul style="list-style-type: none"> • <1 jaar: hoofd 18%, been 14% • ≥1 jaar, per jaar: hoofd -1%, been +0,5%
142		Granuloma annulare		[LO] [E] Papuleus	[LO] [E] Annulaire plaques
142		Lichen planus		[LO] [P] Mucosa ...	[LO] [P] Orale mucosa ...
142		Lichen planus		[LO] [R] Vaak annulaire groepering, soms solitair of gegeneraliseerd	[LO] [R] Vaak gegroepeerd, soms solitair of lineair (bij Köbner-fenomeen)
144		Acrovesiculeus eczeem		[LO] [E] Vesikels	[LO] [E] Vesikels of papels
150		Nummulair eczeem		[LO] [E] Erytheem, vesikels, papels en/of squamae	[LO] [E] Erythemosquameuze plaques
151		Seborroïsch eczeem		[LO] [O] Scherp begrensd	[LO] [O] Onscherp tot matig scherp begrensd
152		Seborroïsch eczeem		[LO] [E] Erytheem, squamae	[LO] [E] Erythemosquameuze papels en plaques, hypopigmentatie bij donkere huidtypes
153		Acute urticaria en angio-oedeem		[A] Jeuk, rode vlekken, medicatie (ACE-remmers)	[A] Jeuk, zwelling gelaat en mond- of keelholte, dyspneu, rode vlekken, medicatie (ACE-remmers) of andere uitlokkende factoren
153		Acute urticaria en angio-oedeem		[!] Injecteer adrenaline bij een anafylactische reactie	<ul style="list-style-type: none"> • Beoordeel patiënt volgens ABCDE • Adrenaline i.m. (EpiPen) bij anafylactische reactie
154		Erythema chronicum migrans		[LO] [K] Rood, met soms een bleek centrum	[LO] [K] (Blauw)rood, met soms een bleek centrum
155		Erythema exsudativum multiforme minor		[LO] [E] Erytheem, soms gecombineerd met oedeem en vesikels	[LO] [E] Erytheem, papels, plaques, soms gecombineerd met oedeem en vesikels
155		Erythema exsudativum multiforme minor		[AO] Lab: t.u.v. infectie	<ul style="list-style-type: none"> • Oriënterend lab, op indicatie verder onderzoek naar onderliggende infectie • Biopt bij twijfel diagnose: epidermale celapoptose, vacuolaire degeneratie basaalcellen, lymfocytexocytose, dermaal lymfocytinfiltraat
155		Erythema exsudativum multiforme minor		[B] Symptomatische behandeling ... de relatie met HSV)	[B] Expectatief beleid
155		Erythema exsudativum multiforme major		[O] Toxisch-allergische reactie op doorgemaakte infectie	[O] Toxisch-allergische reactie op doorgemaakte infectie of geneesmiddelen
156		Erythema exsudativum multiforme major		[AO] Lab: t.u.v. infectie	<ul style="list-style-type: none"> • Oriënterend lab, op indicatie verder onderzoek naar onderliggende infectie • Evt. biopt (zie EEM minor)

Wijzigingen Pocket Dermatologie | 3^e (herziene) druk

156		Erythema exsudativum multiforme major		[B] Geneest spontaan, eventuele onderliggende oorzaak opsporen en behandelen indien mogelijk	<ul style="list-style-type: none"> 👁 Expectatief beleid. Evt. infectie behandelen, consult oog- of KNO-arts bij betrokkenheid ogen of mond-/keelholte. 👉 * Systemische corticosteroïden in ernstige gevallen * (Val)aciclovir bij verdenking herpesinfectie
156		Erythema exsudativum multiforme major			Verwijderd bij [P]: geneest <2-3 wkn
157		Pityriasis rosea		[LO] [E] Erythematosquameuze plaque	[LO] [E] Erythematosquameuze papels en plaques
162		Keloïd		[E] ... incidentie negroïde ras ↑	[E] ... incidentie donker huidtype ↑
162		Keloïd			Toegevoegd bij [R]: donker huidtype
162		Keratoacanthoom			Verwijderd bij [E]: prevalentie Kaukasisch ras 1:1000
163		Keratoacanthoom		[LO] [E] Nodus, vaak met teleangiëctasieën	[LO] [E] Nodus, crusta, soms met teleangiëctasieën
164		Lipoom			Toegevoegd bij [LO] [E]: los van boven- en onderlaag
166		Basaalcelcarcinoom			<p>Toegevoegd bij [B]: 🧠 radiotherapie</p> <p>👉 Systemische medicatie: vismodegib of sonidegib indien lokaal uitgebreid of gemetastaseerd BCC</p> <p>🔪 Conventionele excisie (3 mm marge laagrisico, 5 mm marge hoogrisico tumoren) of Mohs-chirurgie</p>
168		Plaveiselcelcarcinoom		[AO] Evt. MRI of CT met contrast	[AO] Evt. (PET-)CT of MRI bij verdenking infiltratieve groei of afstandsmetastasen, echogelegeide punctie bij lokale lymfadenopathie
168		Plaveiselcelcarcinoom		[B] 🔪 * Palliatief: radiotherapie * Chirurgische excisie ... de voorkeur	[B] 🔪 * Radiotherapie * Chirurgie: conventionele excisie (laagrisico tumoren 5 mm klinische marge, hoogrisico en recidief tumoren 1 cm), Mohs chirurgie * Lymfeklierdissectie in geval van metastasen
168		Plaveiselcelcarcinoom		[P] Prognostische risicofactoren: >4 mm dikte, perineurale of lymfovasculaire invasie, (<4%), locatie op oor of lip, slecht of ongedifferentieerd carcinoom	[P] Prognostische risicofactoren: >6 mm dikte, perineurale invasie, angio-invasie, locatie op oor, lip, slaap of wang, matig of slecht gedifferentieerd of een ongedifferentieerd carcinoom
169		Melanoom		[LO] [E] Tumor, ulceratie	[LO] [E] Macula, soms ulcererende tumor
170		Melanoom		[B] 🔪 * Radiotherapie: zowel curatief als palliatief, chemotherapie: palliatief,	[B] 👉 * Chemotherapie en immunotherapie: kan curatief maar m.n. palliatief bij metastasen

Wijzigingen Pocket Dermatologie | 3^e (herziene) druk

				immunotherapie kan curatief, maar nu vaak nog palliatief bij metastasen * Excisie, afhankelijk van Breslowdikte re-excisie met 1-2 cm marge	* Schildwachtklierprocedure indien stadium pT1b of hoger, o.b.v. uitslag komen patiënten in aanmerking voor adjuvante therapie ✂ Excisie: afhankelijk van Breslowdikte re-excisie met 1-2 cm marge, in situ melanoom 0,5 cm marge * Radiotherapie: zowel curatief als palliatief
171		Café-au-laitvlek		[AO] Genonderzoek t.u.v. neurofibromatose	[AO] Genonderzoek bij multipele vlekken t.u.v. neurofibromatose
172		Lichen sclerosus		[R] Leeftijd >50 jaar, ♀, Kaukasisch, besneden penis	[R] Pieken rond prepuberale en postmenopauzale leeftijd
172		Lichen sclerosus			Toegevoegd bij [E]: hyperkeratose
172		Lichen sclerosus			Toegevoegd bij [P]: onderhoudsbehandeling ter voorkoming van klachten en vermindering van het risico op ontstaan van een plaveiselcelcarcinoom
175		Naevus naevocellularis			Toegevoegd bij [AO]: Beoordeel volgens ABCDE.
190		Herpes genitalis		[E] ... 70% van de populatie heeft een positieve herpes labialis serologie	[E] ... 70% van de populatie heeft een positieve HSV-serologie
191				Kiss of death: besmetting van een neonaat met het herpes genitalis virus door een koortslipkus geeft een risico op overlijden.	Kiss of death: besmetting van een neonaat met het herpes simplexvirus (HSV) door een koortslipkus geeft een risico op overlijden.
203	37	Bacteriële infecties	Cellulitis		Toegevoegd bij [O]: Porte d'entrée bijv. tussen de tenen door tinea pedis
205		Erythrasma		[LO] [E] Roze-rood	[LO] [E] Roze-rood of bruin
205		Necrotiserende fasciitis		[LO] [O] Onscherp begrensd erytheem	[LO] [O] Initieel onscherp begrensd erytheem, later scherpbegrensde bullae en ulceraties
205		Necrotiserende fasciitis		[AO] Niet toereikend, meteen chirurgische exploratie	[AO] Direct chirurgische exploratie bij klinische verdenking, evt. CT bij lastig te beoordelen lichaamsgebied of bij niet opknappen na necrectomie
205		Necrotiserende fasciitis		[B] ✂ AB i.v. voor min. 10 dgn ✂ Ruim chirurgisch verwijderen van necrotisch weefsel, dit kan leiden tot amputaties	[B] ✂ Direct een combinatie van brede, hooggedoseerde antibiotica i.v. i.o.m. microbioloog ✂ Excisie van alle aangedane weke delen, verwijderen van de avitale huid
206		Herpes labialis		[LO] [E] Vesikels, later papels en crustae	[LO] [E] Vesikels, later erosies, papels en crustae

Wijzigingen Pocket Dermatologie | 3^e (herziene) druk

206		Herpes labialis		[B] 🍯 Crèmes met penciclovir of aciclovir: matig effectief, verkorting van ziekte duur met ±1 dag indien <24u wordt gestart	[B] 🍯 Adviezen ter voorkoming van besmetten anderen 🍯 Zinksulfaat/-oxide ter indroging, aciclovircrème 5dd snel starten na opkomen klachten verkort de ziekte duur 1 dag
207		Herpes zoster		[LO] [E] (Hemorragische of pustuleuze) vesikels en bullae op een oedemateuze ondergrond → crustae	[LO] [E] (Hemorragische, pustuleuze of erosieve) vesikels en bullae op een oedemateuze ondergrond → crustae
209		Molluscum contagiosum		[B] 🍯 Soms curettage of cryotherapie	[B] 🍯 Curettage of cryotherapie wordt niet aanbevolen (geen bewijs van effectiviteit)
210		Verruca vulgaris		[LO] [O] Onscherp begrensd	[LO] [O] Matig tot scherp begrensd
210		Verruca vulgaris		[LO] [K] Huidkleurig tot bruin	[LO] [K] Wit-gelig tot bruin
210		Verruca vulgaris		[LO] [E] Vast aanvoelende papel of nodulus, hyperkeratotisch oppervlak	[LO] [E] Verruceuze papels en plaques
210		Verruca vulgaris		[B] 🍯 1dd aanstippen met salicylzuurcollodium 20% 🍯 Cryotherapie, excochleatie of excisie	[B] 🍯 Aanstippen met salicylzuurpreparaten. Andere opties: imiquimod- of 5-fluorouracilcrème, bleomycine. 🍯 Cryotherapie, elektrocoagulatie, pulsed dye laser
211		Onychomycose			Toegevoegd bij [AO] Mycologische kweek of PCR-test
211		Onychomycose		[B] 🍯 * Voetnagels: terbinafine p.o., trisporal p.o. * Handnagels: itraconazol p.o., terbinafine p.o.	[B] 🍯 * Lokaal: miconazolnagellak (6-12 mnd) * Systemisch: terbinafine, itraconazol, evt. fluconazol
212		Tinea capitis		[B] 🍯 * 1 ^e keuze itraconazol aangezien terbinafine niet goed werkt op de Microsporum, 2 ^e keuze is terbinafine * Bij kinderen: griseofulvine	[B] 🍯 * Terbinafine, griseofulvine, itraconazol of fluconazol * Evt. aanpassen op geleide kweek of PCR
213		Tinea corporis		[LO] [K] Rood	[LO] [K] Rood, bruin of grijs
214		Tinea pedis		[B] 🍯 Zie tinea capitis, behandelduur 2-6 wkn of itraconazol	[B] 🍯 1 ^e keuze lokaal terbinafine (zie ook tinea corporis), 1 wk doorbehandelen na verdwijnen huidafwijking • Lokaal: miconazol, terbinafine, ciclopirox • Systemisch: itraconazol, terbinafine, evt. fluconazol
223		Hemangioom			Toegevoegd bij [R]: laag geboortegewicht

Wijzigingen Pocket Dermatologie | 3^e (herziene) druk

224		Luierdermatitis		[E] ... ook voorkomende bij incontinenten bejaarden	[E] ... ook voorkomende bij incontinenten volwassenen
225		Congenitale dermale melanocytose		[LO] [O] Scherp begrensd	[LO] [O] Matig tot scherp begrensd
227		Seborrhoea capitis neonatorum		[LO] [E] Crustae, squamae	[LO] [E] Squamae