

ビーソフテン[®]

販売名：ビーソフテン泡スプレー

特徴

- ビーソフテン泡スプレーは、皮膚に浸透し、末梢血管に作用することで、血流を改善します。また、抗炎症作用と保湿作用で、荒れた皮膚を治します。
- ビーソフテン泡スプレーは、ステロイドは配合していません。
- ビーソフテン泡スプレーは、無香料・無着色です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと。

- (1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人。
- (2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人。(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがある)

2. 次の部位には、使用しないこと。

目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻腔、膣など)。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能・効果

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

用法・用量

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼなどにのばして貼ってください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)使用のつどキャップをしっかりとしめること。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。

なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。

- (4)外用にのみ使用すること。

※出血のある傷口には使用しないでください。(血が止まりにくくなることがある)

※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。

- (5)噴霧する時には、吸入しないよう注意して使用すること。

成分・分量

100g中 ヘパリン類似物質 0.3g 含有

添加物として、グリセリン、D-ソルビトール、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、マクロゴール、メチルパラベン、ヒプロメロース、精製ヒアルロン酸ナトリウム、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところにキャップをして保管すること。
- (2)小児の手の届かないところに保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- (5)持ち歩くとノズルから液がたれてくることがあります。
- (6)保管する際には立てて保管すること。

<お問い合わせ先>

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記に
お願い致します。

帝國製薬株式会社 お客様相談室

電話 (0879)25-2363

受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度

☎0120(149)931

発売元

I&H株式会社

兵庫県芦屋市大槻町1番18号

製造販売元

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地