



**TIVACARE**  
ANESTHESIA

**Anthony C. Harward MS CRNA**  
**Phone # (208) 201-3737**

### **ANTES DE RECIBIR ANESTESIA**

- **No comer ni beber nada 6 horas antes de su cita.**
- **\* Los niños menores de 5 años de edad pueden consumir líquidos claros 4 oz de agua o jugo de manzana SOLO hasta 3 horas antes de su cita programada. El incumplimiento resultará en la cancelación de su cita y la pérdida de su depósito.**
- Si necesita tomar medicamentos programados, tómelos con solo un sorbo de agua e informe a su anestesista qué medicamentos ha tomado.
- **Si tiene asma y usa un inhalador, tráigalo a su cita.**
- Haga que el niño se bañe la mañana de la cita, use ropa holgada e idealmente una camisa de manga corta. También las niñas con pelo largo por favor de poner en una trenza (es más cómodo para su hijo y más fácil de colocar la cabeza en la silla)
- No use joyas, lentes de contacto o maquillaje para su cita.
- Llegue 15 minutos antes a su cita para permitir el tiempo adecuado para el papeleo.
- **Si usted/paciente se enferma, tiene fiebre de más de 100.0 grados o tiene tos/dolor de garganta POR FAVOR comuníquese con el dentista lo antes posible para posiblemente reprogramar.**
- Padres, el día de la anestesia y el procedimiento dental de su hijo, hagan arreglos para que sus otros hijos sean supervisados y, si es posible, no los lleven a la oficina. Su hijo necesitará toda su atención el día de su procedimiento.
- El padre o tutor legal del niño debe permanecer en la oficina durante el procedimiento completo.

### **DESPUÉS DE RECIBIR ANESTESIA**

- **Vete a casa y descansa.** No es inusual tener visión borrosa durante 2-4 horas después. Vigile a los niños de cerca. Su equilibrio será inestable. Su hijo aún puede estar entumecido por la anestesia local, también puede tener una tendencia a morder, masticar los labios, las mejillas y la lengua. Por favor, mantenga a su hijo fuera de peligro.
- **Si su hijo quiere dormir, colóquelo de lado con la barbilla hacia arriba. No es inusual estar mareado, somnoliento o enfermo del estómago después de la anestesia.**
- No conduzca ni realice ninguna decisión/actividad cognitiva importante durante 24 horas. Su hijo puede regresar a la escuela al día siguiente después de la anestesia.
- Comience a comer y beber según lo tolere. Comience lentamente con agua, paletas heladas, Gatorade y progrese a alimentos más sólidos y fáciles de digerir según lo tolere.
- Se pueden tomar medicamentos o antifebriles de acuerdo con el peso del paciente cada 4-6 horas según sea necesario.
- **Llame al dentista si se presentan los siguientes síntomas:**
  - **Sangrado incontrolado**
  - **Hinchazón**
  - **Aumento del dolor**
  - **Fiebre de más de 100 grados**
  - **Náuseas/vómitos durante más de 2 horas**
  - **Somnolencia/mareos por más de 6 horas**

**Si ocurre lo siguiente: respiración lenta, superficial o con dificultad. Dificultad para tragar o si son difíciles de despertar. Llame al 911 o vaya a la sala de emergencias del hospital más cercano**