

AALSCHOLVER

Familie: *Phalacrocoracidae*

Phalacrocorax carbo

EURING: 720



RAS periode:

01-februari - 01 augustus

Aankomst in territorium:

deels gehele jaar aanwezig

Broedperiode: half februari—
half juli

1e ei datum: vanaf half februari

Broedduur: 23-31 dagen

Jongen geboren:
vanaf 15 maart

Ringleeftijd nestjongen:
25-38 dagen oud

De aalscholver is een algemene watervogel in Nederland die in kolonies broedt. Partiële migrant; een deel van de Nederlandse broedvogels trekt weg, en een deel blijft aanwezig het gehele jaar. De aalscholver voedt zich aan verschillende vissoorten, die hij onderwater met zijn gehaakte snavel pakt.

Uiterlijke kenmerken

Grote donkerkleurige vogel met gehaakte snavel, lange hals en lange, afgeronde staart. Juvenile vogels zijn donkerbruin, met variabele hoeveelheid wit op de onderkant. Adulte vogels zijn glanzend zwart met een witte dijvlek en variabele hoeveelheid wit op hun kop. Het wit verdwijnt buiten broedseizoen, behalve op de keel. Het verenkleed van de aalscholver wordt met leeftijd donkerder en glanzender.

Jongen ringen

De bomen waarin aalscholwers nestelen gaan vaak dood. Pas op voor afbrekende takken.

Bijzonderheden

Ze zijn nestblijvers; vliegvlug na circa 50 dagen.

Biometrie

- Vleugel max gestrekt
- Kop + snavel
- Gewicht
- Weegtijd
- Tarsus lengte max
- Lichaamsrui



Legsels: 1x
Aantal eieren: 3-4



18 mm