

APPELVINK

Familie: *Fringillidae*

Coccothraustes coccothraustes

EURING: 17170



De **appelvinck** is een zangvogel die vooral met zaden en vruchten zich voedt. Nederlandse appelvinken zijn zowel stand- als trekvogels. De meeste zijn te vinden op de zandgronden in het midden en oosten van het land en in de westelijke duinstreek.

Uiterlijke kenmerken

Forsgebouwde vinkachtige met sterke snavel. Het verenkleed is gedomineerd door roestbruin met wit en grijs. De snavel is wit in de winter en grijszwart in de zomer. Mannen hebben geheel zwarte slagpenen, terwijl dit bij vrouwen met een asgrijs vlak voorzien is. Juveniele vogels hebben een grijze onderkant met donkere vlekken.



RAS periode:

01-maart - 01 augustus

Aankomst in territorium:

maart; klein aantal is trekvogel

Broedperiode:

april—juli

1e ei datum:

begin april

Broedduur:

9-14 dagen

Jongen geboren:

eind april



Legsels: 1x

Aantal eieren: 4-5



3.3 mm

Biometrie

- Vleugel max gestrekt
- Gewicht, weegtijd
- Lichaamsrui
- Vetgraad Busse
- Handpenlengte
- Tarsus lengte min
- Lichaamsrui

[Trends > Sovon Vogelonderzoek >](#)

[Vogeltrek > Vogeltrekatlas >](#)



Vogeltrekstation

Centrum voor vogeltrek en -demografie