

Baardman

Familie: *Panuridae*

Panurus biarmicus

EURING: 13640



Credit: E. Kleyheeg

De baardman is een zangvogel van rietvelden waar hij in kolonies broedt. Hij voedt zich vooral op insecten en rietzaden. In Nederland is de baardman grotendeels standvogel. Soms zwerft de soort na het broeden massaal en over honderden kilometers uit. Daarbij kunnen nieuwe gebieden worden gekoloniseerd.

Uiterlijke kenmerken

De baardman is grotendeels oranje kleurig en heeft een lange staart. Het mannetje heeft een grijze kop met zwarte 'baard'. De kop van het vrouwtje is oranje zonder grijs en de zwarte baardstrepen. Juveniele vogels lijken op het vrouwtje, maar ze hebben zwarte streepjes op de rug.

Bijzonderheden

Vliegvlug na 12-13 dagen.



RAS periode:

15 maart—01 september

Aankomst in territorium: eind maart—begin mei

Broedperiode: eind april—augustus

1e ei datum: eind april

Broedduur: 10-13 dagen

Jongen geboren: begin mei

Biometrie

- Vleugel max gestrekt
- Staartlengte
- Gewicht, weegtijd
- Tarsus lengte
- Lichaamsrui
- Cloaca, broedvlek
- Handpen score
- Vetgraad Busse



Legsels: 2-4

Aantal eieren: 4-8



2.3 mm