

Bergeend

Familie: Anatidae

Tadorna tadorna

EURING: 1730



De bergeend is een eendachtige gebonden aan de kusten waar hij op slikbodems foerageert voor schaaldiertjes, slakken en wormen. Het broedgebied van de bergeend loopt van Noordwest-Europa tot Zuid-Spanje en van Midden-Europa tot Noordoost-China. De Europese vogels overwinteren vooral in Europa zelf maar ook wel in Noord-Afrika. De meeste Nederlandse bergeenden broeden in de noordwestelijke helft van Nederland en dan vooral in de polders van Noord-Holland, in de oostelijke Delta en in de Waddenzee.

RAS periode:

01 maart - 01 augustus

Aankomst in territorium:

maart

Broedperiode:

april - juni

1e ei datum: begin april

Broedduur: 29-31 dagen

Jongen geboren:

vanaf begin mei

Uiterlijke kenmerken

De grootte van de bergeend valt ergens tussen een eend en een gans. Mannetjes hebben een bont verenkleed met zwart, wit en kastanjebruin en met glanzende, groenzwarte hals en kop. De snavel is rood met een knobbel. Bij vrouwen is de kleur van de snavel minder opvallend, er is geen knobbel. De veren van de kop en nek zijn mat zwart. De strepen op de bord en buik zijn ook smaller.

Bijzonderheden

Vliegvlug na 45-50 dagen.

Biometrie

- Vleugel max gestrekt
- Kop + snavel
- Gewicht, weegtijd
- Tarsus lengte min



Legsels: 1x

Aantal eieren: 8-10



11 mm