

BLAUWBORST

Luscinia svecica

Familie: *Muscicapidae*

EURING: 11060



Credit: E v/d Jagt

De blauwborst is een zangvogel die voedt zich op insecten en bessen. Hij is te vinden in een habitat tussen moerasbossen en rietmoerassen of in gedeeltelijk open, natte gebieden waar voedsel talrijk is. Blauwborsten overwinteren in Zuidwest-Europa en West-Afrika en keren vanaf half maart terug in Nederland. Door nieuw broedbiotoop nam het getal van broedvogels sinds 1970 in Nederland toe.

Uiterlijke kenmerken

Het mannetje blauwborst heeft een opvallende blauwe kin en borst met een witte (of in Scandinavië rode) ster. De blauwe vlek is gevolgd door een zwarte, een witte en een roestbruine band. De staartbasis is oranje kleurig met een zwarte eindband. Bij vrouwtjes is de begrensde blauwe vlek niet aanwezig, maar ze hebben een dunnere blauwe band. Juveniele vogels hebben een gestreept verenkleed zonder vlekken of banden op de borst.

Bijzonderheden

Vliegvlug na 14 dagen.

RAS periode:

01 april - 01 augustus

Aankomst in territorium: eind maart - 1e helft april

Broedperiode: eind april—juni

1e ei datum: eind april

Broedduur: 13-14 dagen

Jongen geboren: midden mei

Biometrie

- Vleugel max gestrekt
- Handpen lengte, handpen score
- Tarsus lengte min
- Gewicht, weegtijd
- Vetgraad Busse
- Lichaamsrui
- Broedvlek, cloaca



Legsels: 1x
Aantal eieren: 5-6



2.3 mm