

# BLAUWE KIEKENDIEF

*Circus cyaneus*

**Familie:** Accipitridae

EURING: 2610



**De blauwe kiekendief** is een roofvogel die op kleine zoogdieren en vogels jaagt. Kiekendieven zijn te vinden in natte gebieden zoals moerassen, grasvelden en akkers. Het broedgebied van de blauwe kiekendief strekt zich uit van West-Europa tot Kamtsjatka in het Russische verre oosten. Zuidelijke populaties zijn standvogels, noordelijke populaties trekvogels. Overwinteringsgebieden liggen in een zone van Zuid-Europa en Noordwest-Afrika via het Midden-Oosten tot Zuidoost-China.

## Uiterlijke kenmerken

Het mannetje blauwe kiekendief is gemakkelijk te onderscheiden van de bruine kiekendief vanwege zijn witte stuit die ook in vlucht opvallend is. Mannetjes zijn overal lichtkleurig, behalve de zwarte vleugelpunten. Vrouwtjes en juveniele zijn bruin met zwarte bandjes die ook te zien zijn over de onder-vleugels en de staart.

## Bijzonderheden

Vliegvlug na 32 - 42 dagen

### RAS periode:

15 maart - 01 augustus

### Aankomst in territorium:

eind maart

**Broedperiode:** eind april - midden juni

**1e ei datum:** eind april

**Broedduur:** 29-31 dagen

### Jongen geboren:

vanaf eind mei

## Biometrie

- Vleugel max gestrekt
- Kop + snavel
- Gewicht
- Handpenlengte
- Tarsus lengte min



Legsels: 1x

Aantal eieren: 4-6



7 of 9 mm