

BLAUWE REIGER

Ardea cinerea

Familie: Ardeidae

EURING: 1220



De blauwe reiger is een algemene reiger die zich op vis, insecten, amfibieën en kleine zoogdieren voedt. Hij is een vogel van weiden, rivieren, meren, plassen en grachten en broedt in kolonies in bomen. Nederlandse blauwe reigers overwinteren grotendeels in eigen land. De rest trekt weg naar Engeland, Duitsland, België, het westelijke deel van Frankrijk en het Iberisch schiereiland. Een klein deel gaat naar Marokko of nog verder naar de Sahelzone in West-Afrika.

Uiterlijke kenmerken

Mannen en vrouwen zien er hetzelfde uit. Adulte vogels in zomerkleed hebben afhangende sierveren op de kop en zwarte kopstreep. In het broedperiode vinden we ook verdere sierveren over de keel en ook over de rug. De snavel is licht oranje kleurig. Juveniele vogels zijn egaler grijs en hebben geen opvallende zwarte kopstrepen of sierveren.

Bijzonderheden

Vliegvlug na 42-55 dagen.

RAS periode:

01 februari - 01 augustus

Aankomst in territorium:

februari - maart

Broedperiode: midden maart - eind juni

1e ei datum: midden maart

Broedduur: 25-28 dagen

Jongen geboren: vanaf midden april

Biometrie

- Vleugel max gestrekt
- Kop + snavel
- Gewicht en weegtijd
- Tarsus lengte min
- Lichaamsrui
- Vetgraad Busse



Legsels: 1x

Aantal eieren: 3-4



13 mm