

LEEF TIJ DEN KAART NESTJONGEN BONTE V LIEGENVANGER.

© Henri Bouwmeester NIVON Goor 2013.



0 dag. Donkere rozerode huid.
Code N0



1 dag. Let op grootteverschil met
evt. nog aanwezig ei. Code N1



2 dagen. Veerbanen op rug en
vleugels worden zichtbaar. Code N1



3 dagen. Veerbanen duidelijk
zichtbaar. Code N1/N2



4 dagen. Verengroei op vleugel
krijgt pinnetjes. Code N1/N2



5 dagen. Verengroei op vleugel
duidelijk pinnen. Code N4



6 dagen. Slagpennen op punt
van spruiten. Code N4



7 dagen. Armpennen spruiten
(begin van kwastjes). Code N5



7 dagen. Armpennen spruiten
(begin van kwastjes). Code N5



8 dagen. Handpennen spruiten
nu ook (kwastjes). Code N5



8 dagen. Handpennen spruiten
nu ook (kwastjes). Code N5



9 dagen. Let nu ook op algehele
veergroei. Code N5



9 dagen. Let op lengte veer
t.o.v. lengte bloedspoel. Code N5



10 dagen. Let op lengte veer
t.o.v. lengte bloedspoel. Code N5



10 dagen. Let op lengte veer
t.o.v. lengte bloedspoel. Code N5

LEEFTIJDENKAART NESTJONGEN BONTE VLEGENVANGER.

© Henri Bouwmeester NIVON Goor 2013.



11 dagen. Let op lengte veer uit bloedspoel. Code N5



11 dagen. Let op lengte veer uit bloedspoel. Code N5



12 dagen. Slagpennen half volgroeid. Code N6



12 dagen. Slagpennen half volgroeid. Code N6



13 dagen. Let op lengte veer uit bloedspoel. Code N7



13 dagen. Let op lengte veer uit bloedspoel. Code N7



14 dagen. Slagpennen driekwart volgroeid. Code N7



14 dagen. Slagpennen driekwart volgroeid. Code N7



15 dagen. Uitvliegdag. Slagpennen vrijwel volgroeid. Code N7



15 dagen. Uitvliegdag. Slagpennen vrijwel volgroeid. Code N7

Tips:

Bepalen leeftijd is **meest betrouwbaar van dag 0 tot dag 8** en te ijken na het als volgt berekenen van de geboortedag bij wekelijkse nestkastcontrole (datum 1^e ei + legselgrootte + 13 dagen = uitkomstdatum). Hierin staat 13 dagen voor de broedtijd minus 1 dag (bonte vliegenvangers broeden 14 dagen) omdat op de dag van laatste eileg het broeden begint. In gevallen waarin al wordt begonnen met broeden voordat het legsel compleet is kan ik aanraden om te rekenen met 12 dagen broedtijd en dit bij werkelijke uitkomstdatum te corrigeren.

LET OP: men moet bij leeftijdsbepaling vanaf ongeveer 5 dagen altijd rekening houden met een mogelijke afwijking van circa 1 dag vanwege het feit dat de groei iets kan achterblijven bij koud weer of vooral bij slechte voedsel-omstandigheden. Deze omstandigheden kunnen er ook toe leiden dat de jongen langer dan 15 dagen in het nest blijven of dat niet het gehele nest op dezelfde dag uitvliegt.

Let bij het bepalen van de leeftijd m.b.v. de foto's van de gespreide vleugel op de verhouding lengte bloedspool / spuitende veer.

Leer van onderlinge leeftijdsverschillen binnen 1 nest (veroorzaakt bij aanvang broeden voor completering legselgrootte).