

Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

独活葛根湯エキス錠クラシエ

(ドッカツカクコントウ)

特 徴

- 「独活葛根湯」は、中国の唐の時代に王^{オウトウ}燾が著わした医書「外^ゲ台^{タイ}秘^ヒ要^{ヨウ}」に記載されている薬方です。
- 肩こり、四十肩、五十肩、寝ちがえに効果があります。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- (5) 発汗傾向の著しい人
- (6) 高齢者
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (8) 次の症状のある人
排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症：四十肩、五十肩、寝ちがえ、肩こり

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	4錠	3回
15才未満	服用しないこと	

(裏面につづきます)

成分

成人1日の服用量12錠(1錠400mg)中、次の成分を含んでいます。

独活葛根湯エキス粉末 ……………2,800mg

カクコン2.5g、ケイヒ・シャクヤク各1.5g、マオウ・ドクカツ各1.0g、シヨウキョウ・タイソウ・カンゾウ各0.5g、ジオウ2.0gより抽出。

添加物として、CMC-Ca、ケイ酸Al、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、セルロースを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますのですててください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<https://www.pmda.go.jp/>
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発売元 **クラシエ薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **クラシエ株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

“Kracie” Kampo

Dokkatsukakkonto Extract Tablets (48 tablets)

For people who are suffering from stiff or frozen shoulders

Ingredients

The daily dose of 12 tablets (400 mg/tablet) contains 2,800 mg of Dokkatsukakkonto extract powder from the following mixed crude drugs;

Pueraria Root 2.5 g, Cinnamon Bark 1.5 g, Peony Root 1.5 g, Ephedra Herb 1.0 g, Aralia Rhizome 1.0 g, Ginger 0.5 g, Jujube 0.5 g, Glycyrrhiza 0.5 g, Rehmannia Root 2.0 g.

As inactive ingredients, this medicine contains Carmellose Calcium, Aluminum Silicate, Anhydrous Silicic Acid, Magnesium Stearate, and Cellulose.

(Precautions relating to Ingredients)

Due to this medicine's use of extract from natural ingredients (crude drugs), there may be slight color variations between tablets.

Indications

Following symptoms in persons with moderate or slightly poor physical strength: Frozen shoulder, shoulder stiffness, neck stiffness, and shoulder pain.

Dosage and administration

Take the following dosages 3 times a day with water or warm water before or between meals.

Adults (15 years and over) - 4 tablets

Less than 15 years - Do not use

Precautions for use

Consultation

1. The following persons should contact a physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation before administration.

(1) Patients undergoing medical treatment from a physician.

(2) Pregnant women or women suspected of being pregnant.

(3) Persons who is physically weak (declining of physical strength or constitutional weakness).

(4) Persons with weak stomach and intestine who have a tendency to diarrhea, diarrhea with severe abdominal pain.

(5) Persons with excessive sweating.

(6) The elderly.

(7) Patients who have experienced rash/redness, itching, etc. with drugs, etc.

(8) Persons with the following symptoms: Urination difficulty.

(9) Persons diagnosed as having the following: Hypertension, heart disease, kidney disease, thyroid disease.

2. If the following symptoms are observed after taking this drug, these may be adverse reactions, so immediately discontinue the use of this drug, and show this document to your physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation.

Affected areas: Symptoms

Skin: Rash/redness, itching

Gastrointestinal system: Loss of appetite, feeling of discomfort in the stomach

3. When symptoms do not improve even after taking the medicine for about 1 month, stop taking this medicine and consult a physician, pharmacist or registered salesperson, being sure to take this instruction leaflet with you.