

Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

クラシエ五苓散錠

(ゴレイサン)

特徴

- 「五苓散」は、漢方の古典といわれる中国の医書「傷寒論」シヨウカンロン「金匱要略」キンキョウリヤクの太陽病中編に収載されている薬方です。
- のどが渇き、尿量が少ない方のむくみ、頭痛などに効果があります。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位（急性胃腸炎、二日酔に服用する場合には5～6回、水様性下痢、暑気あたりに服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：水様性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔

(注)「しぶり腹」とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すものを指します。

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	4錠	3回
15才未満7才以上	3錠	
7才未満5才以上	2錠	
5才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分

成人1日の服用量12錠（1錠400mg）中、次の成分を含んでいます。

タクシャ末	703mg
チョレイ末	422mg
ブクリョウ末	422mg
ソウジュツ末	422mg
ケイヒ末	281mg

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、ケイ酸Al、ステアリン酸Mg、セルロースを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）を用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますので捨ててください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6) 水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<https://www.pmda.go.jp/>
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

クラシエ 薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発 売 元 **クラシエ 薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **クラシエ株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

“Kracie” Kampo

Goreisan Tablets (240 tablets)

Ingredients

The daily dose of 12 tablets (400 mg/tablet) contains;

Powdered Alisma Tuber - 703 mg

Powdered Polyporus Sclerotium - 422 mg

Powdered Poria Sclerotium - 422 mg

Powdered Atractylodes Lancea Rhizome - 422 mg

Powdered Cinnamon Bark - 281 mg

As inactive ingredients, this medicine contains Hydroxypropylcellulose, Aluminum Silicate, Magnesium Stearate, and Cellulose.

(Precautions relating to Ingredients)

Due to this medicine's use of extract from natural ingredients (crude drugs), there may be slight color variations between tablets.

Indications

Following symptoms in persons, regardless of physical strength, who complain of thirst and decreased urine volume accompanying any of dizziness, nausea, vomiting, abdominal pain, headache or edema: Watery diarrhea, acute gastroenteritis (Do not use for shiburihara [tenesmus]*), heat stroke, headache, edema, and hangover.

*shiburihara [tenesmus] refers to the feeling of unsatisfied defecation and repetitive defecation desire with abdominal pain.

Dosage and administration

Take the following dosages 3 times a day with water or warm water before or between meals.

Adults (15 years and over) - 4 tablets /dose

14 - 7 years - 3 tablets /dose

7 - 5 years - 2 tablets /dose

Less than 5 years - Do not use

(Precautions of Dosage and Administration)

When allowing children to take the medicine, a guardian must be present to watch and tell such them how to take it.

Precautions for use

Consultation

1. The following persons should contact a physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation before administration.

- (1) Patients undergoing medical treatment from a physician.
- (2) Pregnant women or women suspected of being pregnant.
- (3) Patients who have experienced rash/redness, itching, etc. with drugs, etc.

2. If the following symptoms are observed after taking this drug, these may be adverse reactions, so immediately discontinue the use of this drug, and show this document to your physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation.

Affected areas: Symptoms

Skin: Rash/redness, itching

3. When symptoms do not improve even after taking the medicine for about 1 month (for 5 - 6 times if you take this medicine for acute gastroenteritis and hangover, and for 5 - 6 days for watery diarrhea and heat stroke), stop taking this medicine and consult a physician, pharmacist or registered salesperson, being sure to take this instruction leaflet with you.