

葛根湯エキスF C錠 [96錠]

成分

成人1日の服用量9錠（1錠412mg）中

葛根湯エキス（1/2量）...2,600mg

〔カッコン4.0g、マオウ・タイソウ各2.0g、ケイヒ・シャクヤク各1.5g、カンゾウ1.0g、ショウキョウ0.5gより抽出。〕

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、クロスポビドン、ステアリン酸Mg、ポニビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、酸化チタン、カルナウバロウを含有する。

効能

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

用法・用量

1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

成人（15才以上）・・・1回3錠

15才未満7才以上・・・1回2錠

7才未満は服用しないこと

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人

(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）

(4) 胃腸の弱い人

(5) 発汗傾向の著しい人

(6) 高齢者

(7) 今までに薬などにより発疹、発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

(8) 次の症状のある人： むくみ、排尿困難

(9) 次の診断を受けた人： 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

患部／症状

皮膚：発疹・発赤、かゆみ

消化器系：吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が現れることがある。
その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称／症状名

偽アルドステロン症、ミオパチー：手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

肝機能障害：発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振があらわれる。

3. 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6日）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

“Kracie” Kampo

Kakkonto Extract FC Tablets (72 tablets)

Ingredients

The adult daily dose of 9 tablets (412 mg/tablet) contains:

Kakkonto extract (1/2 dose) - 2,600 mg

(Extracted from 4.0 g of Pueraria Root, 2.0 g of Ephedra Herb, 2.0 g of Jujube, 1.5 g of Cinnamon Bark, 1.5 g of Peony Root, 1.0 g of Glycyrrhiza, and 0.5 g of Ginger)

As inactive ingredients, this medicine contains Hydroxypropyl Cellulose, Talc, Silicon Dioxide, Croscarmellose Sodium, Crospovidone, Magnesium Stearate, Polyvinyl alcohol-Acrylic acid-Methyl methacrylate copolymer, Titanium Oxide and Carnauba Wax.

Indications

The following medical conditions experienced by people whose physical strength is moderate or better: First signs of a cold (without sweat), sinus colds, sinus infection, headache, stiff shoulders, muscle soreness, and pain in the hands and shoulders.

Dosage and administration

Take the following amount three times a day before or between meals with water or hot water.

Adult (15 years or older) - 3 tablets/dose

7 to 14 years old - 2 tablets/dose

Less than 7 years old - Do not use.

Precautions for use

Consultation recommendations:

1. Please consult with your doctor, pharmacist, or a registered distributor if any of the following applies to you:

- (1) Currently receiving treatment from a doctor
- (2) Pregnant and possibly pregnant women
- (3) Frail physical strength (deteriorated or weak physical strength)
- (4) Prone to digestive problems
- (5) Prone to sweat excessively
- (6) Elderly people
- (7) Have a history of developing rash, redness, or itchiness after taking medicine, etc.
- (8) Currently experiencing the following symptoms: Swelling/puffiness or difficulty with urination

(9) Have been diagnosed with the following symptoms: High blood pressure, heart disease, kidney disease, or thyroid deficiency

2. If you experience any of the following symptoms which are possibly side effects, stop using this product immediately. Consult with your doctor, pharmacist, or a registered distributor and present this document.

Affected part of the body / Symptoms

Skin / Rash, redness, itchiness, pain /

Digestive system / Nausea, vomiting, loss of appetite, stomach discomfort

The following rare and serious symptoms may occur. See your doctor immediately if you experience any of the following:

Symptom name:

Pseudoaldosteronism, myopathy

Listlessness and muscle soreness may appear and gradually intensify in addition to feeling weary and numb in the hands and legs, tightness and rigidity.

Liver functional impairment:

Fever, itchiness, rash, jaundice (yellowing of skin and white part of the eye), brown urine, general listlessness, loss of appetite, etc. may appear.

3. Stop taking this product if medical conditions do not improve after about a month (or for 5 or 6 times if taken for the first signs of a cold, sinus colds, and headache). Consult with your doctor, pharmacist, or a registered distributor and present this document.

4. Consult with your doctor, pharmacist, or a registered distributor if you want to use this product for a long period of time.