

Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

麻杏甘石湯エキス錠クラシエ

(マキョウカンセキトウ)

特 徴

- 「麻杏甘石湯」は、漢方の古典といわれる中国の医書「傷寒論」^{シヨウカン ロン}に記載されている薬方です。
- 強くせきこむ症状や気管支ぜんそく、気管支炎に効果があります。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
(4) 胃腸の弱い人
(5) 発汗傾向の著しい人
(6) 高齢者
(7) 次の症状のある人
むくみ、排尿困難
(8) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるの
で、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感や こわばりに加えて、脱力感、筋肉痛が あらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位(感冒に服用する場合には5～6日間)服用しても症
状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談し
てください

効 能

体力中等度以上で、せきが出て、ときにのどが渇くものの次の諸症：
せき、小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、感冒、痔の痛み

用法・用量

次の量を1日3回食間に水又は白湯にて服用。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	6錠	3回
15才未満7才以上	4錠	
7才未満5才以上	3錠	
5才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分

成人1日の服用量18錠(1錠200mg)中、次の成分を含んでいます。

麻杏甘石湯水製エキス……………700mg
〔カンゾウ1.0g、キョウニン・マオウ各2.0g、セッコウ5.0gより〕
抽出。

添加物として、トウモロコシデンプン、CMC-Ca、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、デキストリンを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。
- (6)1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日を過ぎた場合には服用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<https://www.pmda.go.jp/>
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発売元 **クラシエ薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **クラシエ株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

“Kracie” Kampo

Makyokansekito Extract Tablets (144 tablets)

For the treatment of a violent cough that does not loosen phlegm effectively

Ingredients

The daily dose of 18 tablets (200 mg/tablet) contains 700 mg of water-extracted Makyokansekito extract from the following mixed crude drugs; Glycyrrhiza 1.0 g, Apricot Kernel 2.0 g, Ephedra Herb 2.0 g, Gypsum 5.0 g. As inactive ingredients, this medicine contains Corn starch, Carmellose Calcium, Anhydrous Silicic Acid, Magnesium Stearate, and Dextrin.

(Precautions relating to Ingredients)

Due to this medicine's use of extract from natural ingredients (crude drugs), there may be slight color variations between tablets.

Indications

Following symptoms in persons with moderate or more physical strength who have a cough, and sometimes experience thirst: Coughing, childhood asthma, bronchial asthma, bronchitis, common cold, and hemorrhoid pain.

Dosage and administration

Take the following dosages 3 times a day with water or warm water between meals.

Adults (15 years and over) - 6 tablets

14 - 7 years - 4 tablets

7 - 5 years - 3 tablets

Less than 5 years - Do not use

(Precautions of Dosage and Administration)

When allowing children to take the medicine, a guardian must be present to watch and tell such them how to take it.

Precautions for use

Consultation

1. The following persons should contact a physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation before administration.

(1) Patients undergoing medical treatment from a physician.

(2) Pregnant women or women suspected of being pregnant.

- (3) Persons who is physically weak (declining of physical strength or constitutional weakness).
- (4) Persons who have gastrointestinal weakness.
- (5) Persons with excessive sweating.
- (6) The elderly.
- (7) Persons with the following symptoms: Edema, urination difficulty.
- (8) Persons diagnosed as having the following: Hypertension, heart disease, kidney disease, thyroid disease.

2. If the following symptoms are observed after taking this drug, these may be adverse reactions, so immediately discontinue the use of this drug, and show this document to your physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation.

Affected areas: Symptoms

Skin: Rash/redness, itching

Gastrointestinal system: Nausea, loss of appetite, feeling of discomfort in the stomach

The following serious symptoms may occur in rare cases, immediately seek medical aid.

Symptom names: Symptoms

Pseudoaldosteronism, myopathy: In addition to listlessness, numbness, stretched feeling, and stiffness of hands and feet, feeling of weakness and muscular pain will appear and gradually progress.

3. When symptoms do not improve even after taking the medicine for about 1 month (for 5 - 6 days if you take this medicine for common cold), stop taking this medicine and consult a physician, pharmacist or registered salesperson, being sure to take this instruction leaflet with you.

4. If you take this medicine for a long time, consult a physician, pharmacist, or registered salesperson.