

オンジエキス顆粒 [24包]

成分

成人1日の服用量3包（1包1.5g）中

オンジエキス・・・537mg

（オンジ3.0gより抽出）

添加物として、乳糖、二酸化ケイ素、CMC-Ca、ステアリン酸Mgを含有する。

効能

中年期以降の物忘れの改善

用法・用量

1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

成人（15才以上）・・・1回1包、15才未満は服用しないこと

注意事項

この医薬品は、認知症の治療または予防に効果があるものではありません

使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと減じあの症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の人は服用しないでください

- (1) 次の診断を受けた人 認知症
- (2) 認知症の疑いのある人

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位/症状

皮膚：発疹・発赤、かゆみ

精神神経系：めまい

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 長期連用する場合は、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

“Kracie” Kampo

Onji Extract Granules (24 packets)

This medicine is not intended to have an effect on treatment or prevention for dementia.

Ingredients

The daily dose of 3 packets (1.5 g/packet) contains 537 mg of Onji extract from the following crude drug;

Polygala Root 3.0 g.

As inactive ingredients, this medicine contains Lactose, Silicon Dioxide, Carmellose Calcium, and Magnesium Stearate.

(Precautions relating to Ingredients)

(1) This medicine may interfere with some test values on diabetes.

(2) Due to this medicine's use of extract from natural ingredients (crude drugs), there may be slight color variations between tablets.

Indications

Amelioration of forgetfulness in middle and older age

Dosage and administration

Take the following dosages 3 times a day with water or warm water before or between meals.

Adults (15 years and over) - 1 packet

Less than 15 years - Do not use

Precautions for use

When not to use the product

(If you do not follow these instructions, the current symptoms may worsen or adverse reactions are more likely to occur.)

This product should not be taken in the following persons.

(1) Persons diagnosed as having the following: Dementia.

(2) Those suspected of having dementia.

Consultation

1. The following persons should contact a physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation before administration.

- (1) Patients undergoing medical treatment from a physician.
 - (2) Pregnant women or women suspected of being pregnant.
 - (3) Patients who have experienced allergic symptoms associated with drugs, etc.
2. If the following symptoms are observed after taking this drug, these may be adverse reactions, so immediately discontinue the use of this drug, and show this document to your physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation.

Affected areas: Symptoms

Skin: Rash/redness, itching

Gastrointestinal system: Nausea and vomiting, loss of appetite, feeling of discomfort in the stomach

Neuropsychiatric system: Dizziness

3. The following symptoms may be observed after taking this drug. If these symptoms persist or worsen, discontinue the use of this drug, and show this document to your physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation.

Diarrhea

4. When symptoms do not improve even after taking the medicine for about 1 month, stop taking this medicine and consult a physician, pharmacist or registered salesperson, being sure to take this instruction leaflet with you.

5. If you take this medicine for a long time, consult a physician, pharmacist, or registered salesperson.