

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

「クラシエ」漢方芩桂朮甘湯エキス顆粒 (リョウケイジュツカントウ)

特徴

- 「芩桂朮甘湯」は、漢方の古典といわれる中国の医書「傷寒論」や「金匱要略」に収載され、水毒によっておこる諸症状の治療に用いられる代表的な薬方です。漢方では、胃内停水で過剰な水分があつたり、尿量が少なく体液の調節がうまくいかず、体内の水分の偏在、代謝異常の症状を水毒といい、この水毒が神経症や頭痛、ふらつき、めまい、息切れ、動悸などをおこす大きな原因の一つと考えています。
- めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸がある方の、神経症、めまい、動悸、息切れ、頭痛に効果があります。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3ヶ月未満の乳児



相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊娠又は妊娠していると思われる人
- (3)高齢者
- (4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (5)次の症状のある人
むくみ
- (6)次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。

その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

4.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能

体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症：立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ、神経症、神経過敏

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回
15才未満7才以上	2/3包	
7才未満4才以上	1/2包	
4才未満2才以上	1/3包	
2才未満	1/4包	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

成 分

成人1日の服用量3包(1包1.0g)中、次の成分を含んでいます。

苔桂朮甘湯エキス(1/2量) 800mg
〔ブクリョウ3.0g、ケイヒ2.0g、ビャクジュツ1.5g、カンゾウ〕
1.0gより抽出。

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖を含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日を過ぎた場合には服用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<https://www.pmda.go.jp/>

☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ 薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334

受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発 売 元

クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元

クラシエ株式会社

東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

TS03-S

“Kracie” Kampo

Ryokeijutsukanto Extract Granules

(24 packets)

Ingredients

The daily dose of 3 packets (1.0 g/packet) contains 800 mg of Ryokeijutsukanto extract from the following mixed crude drugs;

Poria Sclerotium 3.0 g, Cinnamon Bark 2.0 g, Atractylodes Rhizome 1.5 g, Glycyrrhiza 1.0 g. As inactive ingredients, this medicine contains Hydroxypropylcellulose, and Lactose.

(Precautions relating to Ingredients)

Due to this medicine's use of extract from natural ingredients (crude drugs), there may be slight color variations between granules.

Indications

Following symptoms in persons with moderate or poor physical strength who have dizziness and wamble, and occasionally hot flashes and/or palpitations: Lightheadedness, dizziness, headache, tinnitus, palpitations, shortness of breath, neurosis, and mental irritability.

Dosage and administration

Take the following dosages 3 times a day with water or warm water before or between meals.

Adults (15 years and over) - 1 packet /dose

14 - 7 years - 2/3 packet /dose

6 - 4 years - 1/2 packet /dose

4 - 2 years - 1/3 packet /dose

Less than 2 years - 1/4 packet /dose

(Precautions of Dosage and Administration)

(1) When allowing children to take the medicine, a guardian must be present to watch and tell such them how to take it.

(2) For infants under 1 year old, treatment by a physician should be prioritized and, when only necessary, allow them to take the medicine.

Precautions

When not to use the product

(If you do not follow these instructions, the current symptoms may worsen or adverse reactions are more likely to occur.)

This product should not be taken in the following persons.

(Don't give this medicine to) children under 3 month of age.

Consultation

1. The following persons should contact a physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation before administration.

(1) Patients undergoing medical treatment from a physician.

(2) Pregnant women or women suspected of being pregnant.

(3) The elderly.

(4) Patients who have experienced rash/redness, itching, etc. with drugs, etc.

(5) Persons with the following symptoms: Edema.

(6) Persons diagnosed as having the following: Hypertension, heart disease, and kidney disease.

2. If the following symptoms are observed after taking this drug, these may be adverse reactions, so immediately discontinue the use of this drug, and show this document to your physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation.

Affected areas: Symptoms

Skin: Rash/redness, itching

The following serious symptoms may occur in rare cases, immediately seek medical aid.

Symptom names: Symptoms

Pseudoaldosteronism, myopathy: In addition to listlessness, numbness, stretched feeling, and stiffness of hands and feet, feeling of weakness and muscular pain will appear and gradually progress.

3. When symptoms do not improve even after taking the medicine for about 1 month, stop taking this medicine and consult a physician, pharmacist or registered salesperson, being sure to take this instruction leaflet with you.

4. If you take this medicine for a long time, consult a physician, pharmacist, or registered salesperson.