

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

クラシエ七物降下湯エキス錠

(シチモツコウカトウ)

特徴

- 「七物降下湯」は、我が国近代の著名な漢方医学学者大塚敬節先生が自身の高血圧症を治療するため創られた薬方です。
- 体力中等度以下の人ののぼせ、肩こり、耳なり、頭重など高血圧に伴う随伴症状に広く用いられています。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能

体力中等度以下で、顔色が悪くて疲れやすく、胃腸障害のないものの次の諸症：高血圧に伴う随伴症状（のぼせ、肩こり、耳なり、頭重）

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	4錠	3回
15才未満	服用しないこと	

成 分

成人1日の服用量12錠(1錠400mg)中、次の成分を含んでいます。
七物降下湯エキス粉末 2,000mg
〔ジオウ・トウキ・センキュウ・シャクヤク・オウギ各1.5g、オウバク1.0g、チョウトウコウ2.0gより抽出。〕

添加物として、セルロース、ケイ酸AI、CMC-Ca、ステアリン酸Mgを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）のエキスを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますので捨ててください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<https://www.pmda.go.jp/>
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ 薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発 売 元

クラシエ 薬品株式会社
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元

クラシエ 株式会社
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

“Kracie” Kampo

Shichimotsukokato Extract Tablets (96 tablets)

Ingredients

The daily dose of 12 tablets (400 mg/tablet) contains 2,000 mg of Shichimotsukokato extract powder from the following mixed crude drugs;
Uncaria Hook 2.0 g, Rehmannia Root 1.5 g, Japanese Angelica Root 1.5 g, Cnidium Rhizome 1.5 g, Peony Root 1.5 g, Astragalus Root 1.5 g, Phelodendron Bark 1.0 g.
As inactive ingredients, this medicine contains Cellulose, Aluminum Silicate, Carmellose Calcium, and Magnesium Stearate.

(Precautions relating to Ingredients)

Due to this medicine's use of extract from natural ingredients (crude drugs), there may be slight color variations between tablets.

Indications

Following symptoms in persons with moderate or poor physical strength who have pale skin, tend to get tired easily, and don't have gastrointestinal disorders: Accessory symptoms of hypertension (hot flashes, shoulder stiffness, tinnitus, heavy head).

Dosage and administration

Take the following dosages 3 times a day with water or warm water before or between meals.

Adults (15 years and over) - 4 tablets

Less than 15 years - Do not use

Precautions for use

Consultation

1. The following persons should contact a physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation before administration.

(1) Patients undergoing medical treatment from a physician.

(2) Pregnant women or women suspected of being pregnant.

(3) Persons with weak stomach and intestine who have a tendency to diarrhea, diarrhea with severe abdominal pain.

2. If the following symptoms are observed after taking this drug, these may be adverse reactions, so immediately discontinue the use of this drug, and show this document to your physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation.

Affected areas: Symptoms

Skin: Rash/redness, itching

Gastrointestinal system: Loss of appetite, feeling of discomfort in the stomach

3. The following symptoms may be observed after taking this drug. If these symptoms persist or worsen, discontinue the use of this drug, and show this document to your physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation.

Diarrhea

4. When symptoms do not improve even after taking the medicine for about 1 month, stop taking this medicine and consult a physician, pharmacist or registered salesperson, being sure to take this instruction leaflet with you.