

# Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

## マツ ワカ末漢方便秘薬錠

漢方処方〈調胃承気湯〉

### 特 徴

- 「ワカ末漢方便秘薬」は、漢方の古典といわれる中国の医書「傷寒論」に収載されている漢方処方「調胃承気湯」にもとづいた製剤です。
- 慢性および急性の便秘に対して、おだやかに、すぐれた排便効果があります。

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

#### 🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
  - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
  - (5) 高齢者
  - (6) 次の症状のある人  
むくみ
  - (7) 次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記のような重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 効 能

体力中等度なものの次の諸症：便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和

## 用法・用量

次の量を1日2回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	3錠	2回
15才未満7才以上	2錠	
7才未満5才以上	1錠	
5才未満	服用しないこと	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させていただきます。

## 成分

成人1日の服用量6錠(1錠300mg)中、次の成分を含んでいます。

調胃承気湯エキス粉末 ……………1,100mg  
(ダイオウ2.5g、カンゾウ1.0g、無水ボウショウ0.5gより抽出。)  
添加物として、アルファー化デンプン、ステアリン酸Mg、クロスCMC-Na、二酸化ケイ素、セルロースを含有する。

### 〈成分に関連する注意〉

- (1)本剤に含まれるダイオウにより、尿が橙色ないし赤色になることがあります。
- (2)本剤は天然物（生薬）のエキスを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますので捨ててください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6)水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<https://www.pmda.go.jp/>  
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

**クラシエ薬品株式会社** お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334  
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ [www.kracie.co.jp](http://www.kracie.co.jp)

発売元 **クラシエ薬品株式会社**  
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **クラシエ株式会社**  
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

# “Kracie” Kampo

## Wakamatsu Kampo Laxative Tablets (72 tablets)

### Ingredients

---

The daily dose of 6 tablets (300 mg/tablet) contains 1,100 mg of Chojikito extract powder from the following mixed crude drugs;

Rhubarb 2.5 g, Glycyrrhiza 1.0 g, Anhydrous Sodium Sulfate 0.5 g.

As inactive ingredients, this medicine contains Magnesium Stearate, Croscarmellose Sodium, Silicon Dioxide, Alpha-Starch and Cellulose.

(Precautions relating to Ingredients)

(1) The rhubarb contained in this medicine may make urine appear orange or red.

(2) Due to this medicine's use of extract from natural ingredients (crude drugs), there may be slight color variations between tablets.

### Indications

---

Following symptoms in persons with moderate physical strength: Constipation, heavy head, hot flashes, eczema/dermatitis, pimple (acne), loss of appetite (anorexia), and fullness of abdomen associated with constipation, abnormal fermentation in the intestines, and hemorrhoids.

### Dosage and administration

---

Take the following dosages 2 times a day with water or warm water before or between meals.

Adults (15 years and over) - 3 tablets

14 - 7 years - 2 tablets

7 - 5 years - 1 tablets

Less than 5 years - Do not use

(Precautions of Dosage and Administration)

When allowing children to take the medicine, a guardian must be present to watch and tell such them how to take it.

### Precautions for use

---

When not to use the product

(If you do not follow these instructions, the current symptoms may worsen or adverse reactions are more likely to occur.)

1. This medicine should not be taken together with the following medicines:

Other cathartic agents.

2. Nursing women should either not take this medicine or stop nursing while taking this medicine.

#### Consultation

1. The following persons should contact a physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation before administration.

(1) Patients undergoing medical treatment from a physician.

(2) Pregnant women or women suspected of being pregnant.

(3) Persons who is physically weak (declining of physical strength or constitutional weakness).

(4) Persons with weak stomach and intestine who have a tendency to diarrhea, diarrhea with severe abdominal pain.

(5) Elderly.

(6) Persons with the following symptoms: Edema.

(7) Persons diagnosed as having the following: Hypertension, heart disease, kidney disease.

2. If the following symptoms are observed after taking this drug, these may be adverse reactions, so immediately discontinue the use of this drug, and show this document to your physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation.

Affected areas: Symptoms

Gastrointestinal system: Diarrhea with severe abdominal pain, abdominal pain

The following serious symptoms may occur in rare cases, immediately seek medical aid.

Symptom names: Symptoms

Pseudoaldosteronism, myopathy: In addition to listlessness, numbness, stretched feeling, and stiffness of hands and feet, feeling of weakness and muscular pain will appear and gradually progress.

3. The following symptoms may be observed after taking this drug. If these symptoms persist or worsen, discontinue the use of this drug, and show this document to your physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation.

Diarrhea

4. When symptoms do not improve even after taking the medicine for about 1 month, stop taking this medicine and consult a physician, pharmacist or registered salesperson, being sure to take this instruction leaflet with you.

5. If you take this medicine for a long time, consult a physician, pharmacist, or registered salesperson.