

Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

「クラシエ」漢方黄連解毒湯エキス顆粒 (オウレンゲドクトウ)

特 徴

- 「黄連解毒湯」は、漢方の古典といわれる中国の医書「肘後方」^{チュウゴホウ}に初めて収載された充血、炎症、興奮を伴った症状に対する薬方です。
- のぼせがみで顔色が赤く、いらいらする傾向のある方の口内炎、湿疹・皮膚炎、胃炎、二日酔、不眠症、鼻出血、血の道症に効果があります。

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人)

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。

その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 1ヵ月位(鼻出血、二日酔に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

体力中等度以上で、のぼせがみで顔色赤く、いらいらして落ち着かない傾向のあるものの次の諸症：鼻出血、不眠症、神経症、胃炎、二日酔、血の道症、めまい、動悸、更年期障害、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ、口内炎

(注)「血の道症」とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状を指します。

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1包	3回
15才未満7才以上	2/3包	
7才未満4才以上	1/2包	
4才未満2才以上	1/3包	
2才未満	1/4包	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

成分

成人1日の服用量3包(1包1.0g)中、次の成分を含んでいます。

黄連解毒湯エキス(1/2量)……………700mg
〔オウゴン1.5g、サンシシ1.0g、オウレン・オウバク各0.75gより抽出。〕

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖を含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）のエキスを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日を過ぎた場合には服用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<https://www.pmda.go.jp/>
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発売元 **クラシエ薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **クラシエ株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

“Kracie” Kampo

Orengedokuto Extract Granules (24 packets)

For the treatment of stomatitis and red dermatitis

Ingredients

The daily dose of 3 packets (1.0 g/packet) contains 700 mg of Orengedokuto extract from the following mixed crude drugs;

Scutellaria Root 1.5 g, Gardenia Fruit 1.0 g, Coptis Rhizome 0.75 g, Phellodendron Bark 0.75 g.

As inactive ingredients, this medicine contains Hydroxypropylcellulose, and Lactose.

(Precautions relating to Ingredients)

Due to this medicine's use of extract from natural ingredients (crude drugs), there may be slight color variations between granules.

Indications

Following symptoms in red-faced persons with moderate or more physical strength who get hot flashes easily and become irritated and restless easily: Nosebleed, insomnia, neurosis, gastritis, hangover, chi-no-michi-sho*, dizziness, palpitation, menopausal disorders, eczema/dermatitis, itching, and stomatitis.

*Chi-no-michi-sho is a generic term for neuropsychiatric symptoms such as anxiety and irritation, and physical symptoms due to fluctuation of female hormones caused by menstruation, pregnancy, childbirth, and menopause.

Dosage and administration

Take the following dosages 3 times a day with water or warm water before or between meals.

Adults (15 years and over) - 1 packet

14 - 7 years - 2/3 packet

6 - 4 years - 1/2 packet

4 - 2 years - 1/3 packet

Less than 2 years 1/4 packet

(Precautions of Dosage and Administration)

(1) When allowing children to take the medicine, a guardian must be present to watch and tell such them how to take it.

(2) For infants under 1 year old, treatment by a physician should be prioritized and, when only necessary, allow them to take the medicine.

Precautions for use

When not to use the product

(If you do not follow these instructions, the current symptoms may worsen or adverse reactions are more likely to occur.)

This product should not be taken in the following persons.

(Don't give this medicine to) children under 3 month of age.

Consultation

1. The following persons should contact a physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation before administration.

(1) Patients undergoing medical treatment from a physician.

(2) Pregnant women or women suspected of being pregnant.

(3) Persons who is physically weak (declining of physical strength or constitutional weakness).

2. If the following symptoms are observed after taking this drug, these may be adverse reactions, so immediately discontinue the use of this drug, and show this document to your physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation.

The following serious symptoms may occur in rare cases, immediately seek medical aid.

Symptom names: Symptoms

Interstitial pneumonia: Shortness and/or difficulties of breath when go upstairs or overwork, sudden dry cough and/or fever and it continuance.

Hepatic function failure: Symptoms, such as fever, itching, rash, jaundice (yellowing of skin and white of eyes), brown urine, general malaise, loss of appetite, etc. may occur.

Mesenteric phlebosclerosis: Abdominal pain, diarrhea, constipation, abdominal distension, etc. may occur repeatedly with long-term oral administration.

3. When symptoms do not improve even after taking the medicine for about 1 month (for 5 - 6 times if you take this medicine for Nosebleed, and hangover), stop taking this medicine and consult a physician, pharmacist or registered salesperson, being sure to take this instruction leaflet with you.

4. If you take this medicine for a long time, consult a physician, pharmacist, or registered salesperson.