

Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

胃腸薬

止逆清和錠

(シギャクセイワジョウ)

特 徴

- 「止逆清和錠」は、胆汁分泌を促進させて消化吸収を盛んにする牛胆汁エキス末、胃酸を中和し胃の調子を整えるボレイ、胃腸機能を整えるカンゾウ・ケイヒ・ショウキョウ・オウバクの6種類の生薬から成る胃腸薬です。
- 胃酸の逆流などによる胸やけ・胸つかえ・胃もたれなどの不快な胃腸症状に効果があります。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 高齢者
(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
5. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ（胃もたれ）、胃重、胸つかえ、げっぷ（おくび）、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、飲み過ぎ（過飲）、胃痛、消化促進、消化不良、食欲不振（食欲減退）、食べ過ぎ（過食）、消化不良による胃部・腹部膨満感

用法・用量

次の量を1日3回食後又は食間に水又は白湯にて服用。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	3錠	3回
15才未満11才以上	2錠	
11才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分

成人1日の服用量9錠（1錠300mg）中、次の成分を含んでいます。

牛胆汁エキス末 ……………300mg
オウバク末 ……………150mg
カンゾウ末 ……………150mg
ケイヒ末 ……………50mg
ショウキョウ末 ……………50mg
ボレイ末 ……………1,000mg

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、デキストリンを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）を用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 水分が錠剤につきまると、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。
- (6) 1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日を過ぎた場合には服用しないでください。



副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発売元 **クラシエ薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **剂盛堂薬品株式会社**
和歌山市太田二丁目8番31号 (〒640-8323)

“Kracie” Kampo

Shigyakuseiwajo (36 tablets)

For the treatment of heartburn due to acid reflux and upset stomach

Ingredients

The daily dose of 9 tablets (300 mg/tablet) contains;

Bovine Bile extract powder - 300 mg

Powdered Phellodendron Bark - 150 mg

Powdered Glycyrrhiza - 150 mg

Powdered Cinnamon Bark - 50 mg

Powdered Ginger - 50 mg

Powdered Oyster Shell - 1,000 mg

As inactive ingredients, this medicine contains Hydroxypropylcellulose, Corn Starch, Anhydrous Silicic Acid, Magnesium Stearate, and Dextrin.

(Precautions relating to Ingredients)

Due to this medicine's use of extract from natural ingredients (crude drugs), there may be slight color variations between tablets.

Indications

Hyperacidity, heartburn, feeling of discomfort in the stomach, feeling of fullness in the stomach, constricted feeling in the stomach (stomach heaviness), heaviness in the stomach, heaviness in the chest, belching (burping), nausea (retching, stomach retching, retching due to hangovers and overdrinking, sick feeling, and feeling of sickness), vomiting, excessive drinking (overdrinking), stomachache, promoting digestion, indigestion, loss of appetite (anorexia), excessive eating (overeating), and feeling of fullness in the stomach and abdomen due to indigestion.

Dosage and administration

Take the following dosages 3 times a day with water or warm water after or between meals.

Adults (15 years and over) - 3 tablets

14 - 11 years - 2 tablets

Less than 11 years - Do not use

(Precautions of Dosage and Administration)

When allowing children to take the medicine, a guardian must be present to watch and tell such them how to take it.

Precautions for use

Consultation

1. The following persons should contact a physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation before administration.

- (1) Patients undergoing medical treatment from a physician.
- (2) Pregnant women or women suspected of being pregnant.
- (3) The elderly.
- (4) Patients who have experienced rash/redness, itching, etc. with drugs, etc.

2. If the following symptoms are observed after taking this drug, these may be adverse reactions, so immediately discontinue the use of this drug, and show this document to your physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation.

Affected areas: Symptoms

Skin: Rash/redness, itching

3. The following symptoms may be observed after taking this drug. If these symptoms persist or worsen, discontinue the use of this drug, and show this document to your physician, pharmacist, or registered salesperson for a consultation.

Constipation

4. When symptoms do not improve even after taking the medicine for about 2 weeks, stop taking this medicine and consult a physician, pharmacist or registered salesperson, being sure to take this instruction leaflet with you.

5. Please consult a physician, pharmacist or registered salesperson when using this medicine together in combination with other drugs or medical products, etc., because caution must be taken regarding increased amounts of cumulative ingredients.