

薬効

体力中等度以上で、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症：月経不順、月経困難症、月経痛、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状（頭痛、めまい、肩こり）、痔疾、打撲症



用法・容量

食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年齢	1回の服用量	1日の服用回数
成人（15才以上）	1包	3回
15才未満7才以上	2/3包	
7才未満	服用しないこと	

原材料名・成分表示

成人1日の服用量3包（1包1.2g）中、次の成分を含んでいます。
桃核承気湯エキス粉末・1,250mgを含有、下記の材料より抽出：

トウニン	2.5 g
ケイヒ	2.0 g
ダイオウ	1.5 g
カンゾウ	0.75 g
無水ボウショウ	0.5 g

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールを含有する。



INDICATIONS

For individuals with moderate or higher physical strength, tendency for hot flashes and constipation: menstrual irregularities, dysmenorrhea, menstrual pain, postpartum psychological anxiety, low back pain, constipation, accompanying symptoms of hypertension (headache, dizziness, shoulder stiffness), hemorrhoids, and contusions.



DOSAGE

Take the following dosages with water or warm water before or between meals

Age	One dosage	Daily dosage
Adults (over 15 years)	1 pack	3 times
7-15 years	2/3 pack	
Under 7 years	Do not use	

INGREDIENTS

In the daily dose of 3 packets (1 packet 1.0g) for adults, it contains the following components: tokakujokito Extract Powder 1,250 mg
Extracted from:

Peach kernels	2.5 g
Cinnamon sticks	2.0 g
Rhubarb	1.5 g
licorice	0.75 g
borax	0.5 g

Additives include hydroxypropyl cellulose, lactose, polyoxyethylene polyoxypropylene glycerin.

中文說明

桃核承氣湯提取物顆粒
【第二類醫藥品】
功能和效果

體力中等以上，有潮熱、便秘傾向者、出現以下症狀人士適用：月經不調、痛經、產後心理焦慮、腰痛、便秘、高血壓伴發症狀（頭痛、頭暈、肩部僵硬）、痔瘡、挫傷。


用法和用量

飯前或飯間用冷水或熱水服用。

年 齡	1 次用量	1 天服用次數
15 歲及以上成人	1包	3次
7歲以上未滿 15 歲	2/3包	
7歲以下	請勿使用	

成分和含量

每日成人服用量为3包（每包1.2克），包含桃核承氣湯提取物粉末.....1,250毫克、提取自以下成分。

桃仁	2.5克
桂枝	2.0克
大黃	1.5克
甘草	0.75克
硼砂	0.5克

添加劑包括羥丙基纖維素、乳糖、聚氧乙烯聚氧丙烯甘油。

【第二类医药品】

功能和效果

体力中等以上，有潮热、便秘倾向者、出现以下症状人士适用:月经不调、痛经、痛经、产后心理焦虑、腰痛、便秘、高血压伴发症状（头痛、头晕、肩部僵硬）、痔疮、挫伤。



用法和用量

饭前或饭间用冷水或热水服用。

年龄	1次用量	1天服用次数
15岁及以上成人	1包	3次
7岁以上未满15岁	2/3包	
未满7岁	请勿服用	

成分和含量

每日成人服用量为3包（每包1.2克），包含桃核承气汤提取物粉末.....1,250毫克，提取自以下成分。

桃仁	2.5克
桂枝	2.0克
大黄	1.5克
甘草	0.75克
硼砂	0.5克

添加剂包括羟丙基纤维素、乳糖、聚氧乙烯聚氧丙烯甘油。