

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

漢方製剤

第2類医薬品

ツムラの漢方製剤

ツムラ漢方桔梗湯エキス顆粒

「桔梗湯」は、漢方の原典である『傷寒論』、『金匱要略』に記載されている漢方薬で、のどが痛み、ときにせきが出る方の「扁桃炎」、「扁桃周囲炎」に用いられています。『ツムラ漢方桔梗湯エキス顆粒』は、「桔梗湯」から抽出したエキスより製した服用しやすい顆粒です。

⚠ 使用上の注意

🗨️ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 高齢者。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|------------|
| 消 化 器 | 食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|---------------------|---|
| 偽アルドステロン症、 ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

●効能・効果

体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛み、ときにせきができるものの次の諸症：
扁桃炎、扁桃周囲炎

●用法・用量

次の量を、少しずつ口中に含み、水またはお湯で、徐々に溶かし服用してください。

| 年 齢 | 1 回 量 | 1 日服用回数 |
|-----------|------------|---------|
| 成人(15歳以上) | 1包(1.875g) | 2回 |
| 7歳以上15歳未満 | 2 / 3包 | |
| 4歳以上 7歳未満 | 1 / 2包 | |
| 2歳以上 4歳未満 | 1 / 3包 | |
| 2歳未満 | 服用しないでください | |

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

●成分・分量

本品2包(3.75g)中、下記の割合の混合生薬の乾燥エキス0.625gを含有します。

日局カンゾウ……………1.5g 日局キキョウ……………1.0g

添加物として日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物を含有します。

●保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
4. 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を用いた製品ですので、製品により多少顆粒の色調等が異なることがあります。効能・効果にはわかりありません。
5. 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

お問い合わせ先

本製品内容について、何かお気付きの点がございましたら、
お買求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

製造販売元

株式会社ツムラ 東京都港区赤坂2-17-11 〒107-8521

| | |
|---------------------------|---|
| お客様相談窓口 電話0120-329-930 | 受付時間9:00～17:30(土日祝を除く) https://www.tsumura.co.jp/ |
|---------------------------|---|

Information sheet for customer


Tsumura-Kampo Kikyoto[桔梗湯] Extract Granules

【Category 2 OTC medicines】

INDICATIONS

Following symptoms in persons who have swelling and pain of the throat, and sometimes experience coughing. This medicine can be applied to everyone regardless of physical performance:

Tonsillitis and peritonsillitis.



! CAUTION FOR USE

●Who should seek consultation

1. The following persons should consult a physician, pharmacist, or registered distributor before taking this medicine.
 - (1) Persons undergoing medical treatment from a physician.
 - (2) Pregnant women or women suspected of being pregnant.
 - (3) Persons with weak stomach and intestine who have a tendency to diarrhea.
 - (4) Elderly persons.
 - (5) Persons with the following symptoms: edema.
 - (6) Persons diagnosed as having the following: hypertension, heart disease, kidney disease.
2. The following symptoms may be adverse reactions to this medication. If any of these symptoms occur, stop taking this medicine immediately and consult a physician, pharmacist, or registered distributor. Take the instruction leaflet with you.

| Related areas | Symptoms |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Gastrointestinal system | Loss of appetite, gastric distress. |

In very rare cases the following serious symptoms may occur. In this case, consult a physician immediately.

| Symptoms' name | Symptoms |
|------------------------------------|--|
| Pseudohyperaldosteronism, myopathy | In addition to listlessness, stretched feeling, and stiffness of hands and feet, feeling of weakness and muscular pain will appear and gradually worsen. |

3. Stop taking this medicine and consult a physician, pharmacist or registered distributor if symptoms do not improve after taking this medicine for 5 to 6 times. Take this leaflet with you.
4. If you take this medicine regularly for a long periods, consult a physician, pharmacist or registered distributor.

DOSAGE

Following doses should be taken as follows: Hold small amount of this medicine in the mouth by dividing into batches, dissolve it slowly with water or warm water, and swallow it little by little.

| Age | One dosage | Daily dosage |
|-------------------|--------------------|---------------|
| 15 years and over | 1 packet (1.875 g) | 2 times a day |
| 7-14 years | 2/3 packet | |
| 4-6 years | 1/2 packet | |
| 2-3 years | 1/3 packet | |
| Less than 2 years | Do not use | |

[Cautions] This medication should be given to children only under adult supervision

INGREDIENTS

2 packets (3.75 g) of this medicine contain 0.625 g of Kikyoto extract of the following mixed crude drugs;

| | |
|--------------------|-------|
| JP Glycyrrhiza | 1.5 g |
| JP Platycodon Root | 1.0 g |

(JP: The Japanese Pharmacopoeia)

Inactive ingredients: JP Magnesium Stearate, JP Lactose Hydrate.

PRECAUTIONS FOR STORAGE AND HANDLING

- (1) Store in a cool, dry place free from direct sunlight.
- (2) Keep all medication out of the reach of children.
- (3) When you take this medicine in divided dose, fold over the opened edge of the packet and store it.
The remaining medicine should be taken within 2 days.
- (4) Since the medicine contains crude drugs, the granules color may vary for individual products, however this has no influence on the efficacy of this medicine.
- (5) Do not take this medicine after the expiration date.

Production of this product has been approved for domestic sales in accordance with the Pharmaceutical Affairs Law of Japan.



Tsumura&Co. 2-17-11, Akasaka, Minato-ku, Tokyo107-852, JAPAN.
<https://www.tsumura.co.jp/>

中文说明

TSUMURA 汉方 桔梗汤 提取物颗粒

【第二类医药品】

功能和效果

可用于各种体力，咽喉肿痛、时有咳嗽的人士的以下各种症状：
扁桃体炎、扁桃体周围脓肿

注意事项

□咨询事项

1. 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：

- (1) 正在接受医生治疗的人士
- (2) 孕妇或疑似怀孕的人士
- (3) 肠胃弱、容易腹泻的人士
- (4) 老年人
- (5) 有以下症状的人士：
 浮肿
- (6) 被诊断为患有以下疾病的人士：
 高血压、心脏病、肾脏病

2. 服用后如果出现以下症状，则有可能是副作用，请立即停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

| 相关部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 消化系统 | 食欲不振、胃部不适 |

偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

| 症状名称 | 症 状 |
|-------------|----------------------------------|
| 假性醛固酮增多症、肌病 | 除手脚酸软、麻痹、痉挛、僵硬外，还出现乏力感、肌肉痛，并逐渐增强 |

3. 如果服用 5-6 次症状仍未好转，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。

4. 如果需要长期连续服用，请咨询医生、药剂师或注册销售人员。



用法和用量

请按以下用量，一点点分次含于口中，再以用开水或温水慢慢溶解送服：

| 年 龄 | 1 次用量 | 1 天服用次数 |
|--------------|--------------|---------|
| 15 岁及以上成人 | 1 包 (1.875g) | 2 次 |
| 7 岁以上未满 15 岁 | 2/3 包 | |
| 4 岁以上未满 7 岁 | 1/2 包 | |
| 2 岁以上未满 4 岁 | 1/3 包 | |
| 未满 2 岁 | 请勿服用 | |

<用法用量的相关注意事项>

幼儿服用时，请在监护人的指导监督下服用。

成分和含量

2 包本品 (3.75g) 中，含有下述比例的混合中草药干燥提取物 0.625g：

| | |
|--------|-------|
| 日本药典甘草 | 1.5 g |
| 日本药典桔梗 | 1.0 g |

有关添加物：含有日本药典硬脂酸镁、日本药典乳糖水合物

保管及使用注意事项

1. 请在阳光直接照射不到的阴凉干燥之处保存。
2. 请在幼儿无法触及之处保存。
3. 1 包分次服用的，如袋中尚有剩余制剂，请将袋口翻折、保存，并于 2 日内服用完毕。
4. 本剂使用了生药（药用的草根树皮等），因此产品的颗粒可能会存在有些许色调差异等情况，但并不影响其功能和效果。
5. 请勿服用已过保质期的产品。

本产品依照日本法律取得生产和销售许可。



邮编：107-8521 东京都港区赤坂 2-17-11 <https://www.tsumura.co.jp/>

中文說明

TSUMURA 漢方 桔梗湯 提取物顆粒

【第二類醫藥品】

功能和效果

可用於各種體力、咽喉腫痛、時有咳嗽的人士的以下各種症狀：
扁桃體炎、扁桃體周圍膿腫



注意事項

□諮詢事項

1. 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

- (1) 正在接受醫生治療的人士
- (2) 孕婦或疑似懷孕的人士
- (3) 腸胃弱、容易腹瀉的人士
- (4) 老年人
- (5) 有以下症狀的人士：
浮腫
- (6) 被診斷為患有以下疾病的人士：
高血壓、心臟病、腎臟病

2. 服用後如果出現以下症狀、則有可能是副作用、請立即停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

| 相關部位 | 症 狀 |
|------|-----------|
| 消化系統 | 食欲不振、胃部不適 |

偶爾可能會發生以下嚴重症狀、此時請立即接受醫生的診治：

| 症狀名稱 | 症 狀 |
|-------------|----------------------------------|
| 假性醛固酮增多症、肌病 | 除手腳酸軟、麻痺、痙攣、僵硬外、還出現乏力感、肌肉痛、並逐漸增強 |

3. 如果服用 5-6 次症狀仍未好轉、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。
4. 如果需要長期連續服用、請諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

用法和用量

請按以下用量、少量分次含於口中、再以涼開水或溫水慢慢溶解送服：

| 年 齡 | 1 次用量 | 1 天服用次數 |
|--------------|--------------|---------|
| 15 歲及以上成人 | 1 包 (1.875g) | 2 次 |
| 7 歲以上未滿 15 歲 | 2/3 包 | |
| 4 歲以上未滿 7 歲 | 1/2 包 | |
| 2 歲以上未滿 4 歲 | 1/3 包 | |
| 未滿 2 歲 | 請勿服用 | |

<用法用量的相關注意事項>

幼兒服用時、請在監護人的指導監督下服用。

成分和含量

2 包本品 (3.75g) 中、含有下述比例的混合生藥乾燥提取物 0.625g：

| | |
|--------|-------|
| 日本藥典甘草 | 1.5 g |
| 日本藥典桔梗 | 1.0 g |

有關添加物：含有日本藥典硬脂酸鎂、日本藥典乳糖水合物

保管及使用注意事項

- 1.請於陽光直接照射不到的陰涼乾燥之處保存。
- 2.請於幼兒無法觸及之處保存。
- 3.1 包分次服用的、如袋中尚有剩餘藥劑、請將袋口翻折保存、並在 2 天內服用完畢。
- 4.本劑使用了生藥（藥用的草根樹皮等）、因此產品的顆粒可能會存在有些許色調差異等情況、但並不影響其功能和效果。
- 5.請勿服用已過保質期的產品。

本產品依照日本法律取得生產、銷售許可。



郵遞區號：107-8521 東京都港區赤坂 2-17-11

<https://www.tsumura.co.jp/>