




Con
pectina de
manzana

Ejercicio para los intestinos



Ibedex

Para fortalecer los
microorganismos del intestino.

- Base para una flora intestinal estable mediante fibras alimentarias
- Influencia positiva sobre el microbioma gracias a los prebióticos
- Soporte durante el tratamiento y el período de convalecencia
- Apto para alérgicos



Ibedex

Alimento complementario para gatos, perros, terneros y ganado vacuno. Para fortalecer los microorganismos del intestino.

Los prebióticos influyen positivamente en el microbioma al proporcionar una buena base nutricional y de crecimiento para determinadas cepas bacterianas "deseables" en el colon. La proliferación de estas cepas hace que los gérmenes indeseables (patógenos) dejen de propagarse y sean desplazados y sustituidos por ellas.

A diferencia de los probióticos, los prebióticos no son bacterias vivas, sino fibras alimentarias no digeribles. Por eso pueden atravesar el estómago y el intestino delgado "sin obstáculos" y llegar al intestino grueso. La ingesta adicional de prebióticos también es beneficiosa en las dietas: regulan el nivel de azúcar en sangre ya que dificultan la absorción de hidratos de carbono aprovechables. Además, los ácidos biliares y el amoníaco se ligan en el intestino y se excretan mejor, aliviando así el hígado y los riñones.

Ibedex

Tipo de producto
Alimento complementario para gatos, perros, terneros y ganado vacuno
Contenido
150 / 300 / 450g polvo
Composición
Pectina de manzana, inulina (procedente de achicoria, alcachofa de Jerusalén, alcachofa o agave), cáscara de psyllium
Componentes analíticos
Proteína cruda (1,1%), ceniza cruda (1,6%), fibra cruda (27,8%), grasa cruda (0,4%), calcio (0,12%), magnesio (0,02%), sodio (0,05%), fósforo (< 0,05%)
Aditivos tecnológicos (por kg)
Celulosa microcristalina (500.000mg)
Dosis diaria recomendada
  1 x por día
Cantidad inicial: 0,5-1 cuchar medidora rasa por animal
Aumentar la dosis progresivamente durante una semana en 0,5-1 cuchar medidora rasa hasta que la consistencia de las heces se corresponda con la recomendación del veterinario.
Dosis máxima diaria: 3 cucharas medidoras rasas (ca. 5g) por cada 5kg de peso corporal.
  1 x por día
Cantidad inicial para terneros: 1,5 cucharas medidoras rasas por animal
Cantidad inicial para bovinos: 3 cucharas medidoras rasas por animal
Aumentar la dosis diariamente entre 1 y 5 cucharas medidoras rasas hasta que la consistencia de las heces se corresponda con la recomendación de los veterinarios.
Ibedex puede mezclarse con leche; en este caso debe administrarse inmediatamente.
1 cuchar medidora rasa ≈ 3 ml ≈ aprox. 1,6g
Modo de empleo
Ibedex puede mezclarse con la ración diaria de alimentos.
Adecuado para un uso prolongado.
Dejar suficiente agua disponible en todo momento.
Información sobre la vida útil y la caducidad
No conservar a temperaturas superiores a 30°C.
Una vez abierto consumir antes de 3 meses.
Indicaciones
 Apto para mascotas propensas a las alergias.
 Sin azúcares añadidos.
 Vegano.
Mantener fuera del alcance de los animales.
Fabricado en Alemania.

Haz tu pedido ahora -
venta exclusiva en
consultorios y clínicas
veterinarias:



EN LÍNEA inuvel.com
EMAIL: info@inuvel.com



WHATSAPP +49 175 8063269
TELÉFONO +34 960 13 58 94
FAX +34 960 13 58 95

PLNT Group Ibérica SL
Carrer del Marquill Cadaro 26, 2-4
46005 Valencia

Ingredientes (extracto)

Inulina (*prebiótico*)

La inulina pertenece a la familia de los prebióticos que no son digeribles por las enzimas del propio organismo, constituyendo así un sustrato fermentable para las bacterias de la flora intestinal. La inulina favorece el crecimiento de bacterias intestinales beneficiosas, como *Enterococcus faecium*; en cambio, los gérmenes patógenos no se ven favorecidos. Por ello, se atribuye a la inulina un efecto positivo sobre el sistema inmunitario. Cuando las bacterias intestinales -como *Enterococcus faecium*- metabolizan la inulina se liberan ácidos orgánicos, que tienen un efecto estabilizador sobre el microbiota intestinal. Las pruebas realizadas en cachorros también han demostrado que la inulina añadida a los alimentos reduce la colonización de salmonelas.

Psyllium (*Plantago ovata*)

La cáscara del psyllium tiene la capacidad natural de hincharse. Sus semillas pueden absorber hasta 40 veces su propio peso en agua. Al entrar en contacto con el medio acuoso, se forma una capa protectora que recubre la mucosa gástrica y el esófago. Al llegar al intestino, la cáscara de psyllium asimila el exceso de líquido. De este modo las heces se consolidan y el tránsito intestinal se regula de forma natural.

Celulosa microcristalina

La celulosa microcristalina se obtiene de fibras vegetales y tiene la propiedad de no ser absorbida ni digerida por el organismo. La fibra, como por ejemplo la celulosa microcristalina, regula la digestión y favorece la salud de la flora intestinal. Las bacterias intestinales beneficiosas pueden multiplicarse y producir importantes ácidos grasos de cadena corta.