

Diez primeras causas de morbilidad de los pacientes intervenidos en cirugía, por grupos de edad y sexo de acuerdo a capítulos de la CIE-10. 2022

Ord.	Causas de morbilidad según CIE-10	Frecuencia	Porcentaje	Grupo de edad						Sexo		Destino a la salida de la cirugía	
				-1	1-4	5-14	15-44	45-59	60 +	F	M	Hospitalización	Alta
1	APENDICITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	191	1.3%	0	15	50	92	21	13	72	119	117	74
2	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	179	1.3%	0	2	9	100	34	34	65	114	19	160
3	FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA	171	1.2%	0	1	12	123	24	11	33	138	146	25
4	APENDICITIS, NO ESPECIFICADA	157	1.1%	0	3	34	92	17	11	65	92	86	71
5	TRASTORNOS DE DISCO LUMBAR Y OTROS, CON RADICULOPATIA	146	1.0%	0	0	0	43	33	70	74	72	143	3
6	INFECCION CONSECUTIVA A PROCEDIMIENTO, NO CLASIFICADA EN OTR	136	1.0%	0	1	4	63	16	52	50	86	132	4
7	FISTULA ANORRECTAL	129	0.9%	0	0	0	52	54	23	30	99	9	120
8	TRASPLANTE DE RINON	127	0.9%	0	0	3	75	29	20	69	58	100	27
9	FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DE LA TIBIA	127	0.9%	0	0	1	108	15	3	45	82	107	20
10	PREPUCIO REDUNDANTE, FIMOSIS Y PARAFIMOSIS	121	0.9%	0	26	25	47	12	11	0	121	5	116
Subtotal		1,484	10.5%	0	48	138	795	255	248	503	981	864	620
Total General		14,193	100.0%	255	500	1,041	5,811	2,690	3,896	5,497	8,696	9,882	4,311

Fuente de Información: Departamento de Informática en salud