

Diez primeras causas de morbilidad de los pacientes intervenidos en cirugía, por grupos de edad y sexo de acuerdo a capítulos de la CIE-10. 2023

Ord.	Causas de morbilidad según CIE-10	Frecuencia	Porcentaje	Grupo de edad						Sexo		Destino a la salida de la cirugía	
				-1	1-4	5-14	15-44	45-59	60 +	F	M	Hospitalización	Alta
1	APENDICITIS, NO ESPECIFICADA	376	2.40%	0	15	124	174	32	31	151	225	224	152
2	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	209	1.30%	0	1	21	122	34	31	71	138	24	185
3	FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DE LA TIBIA	184	1.20%	0	0	7	144	22	11	61	123	137	47
4	TRASTORNOS DE DISCO LUMBAR Y OTROS, CON RADICULOPATIA	169	1.10%	0	0	0	33	37	99	95	74	167	2
5	FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA	164	1.10%	0	2	9	113	31	9	29	135	139	25
6	INFECCION CONSECUTIVA A PROCEDIMIENTO, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	164	1.10%	1	0	7	72	27	57	61	103	161	3
7	ESGAINCES TORCEDURAS QUE COMPROMETE EL LIGAMENTO CRUZADO (ANTERIOR) (POSTERIOR) DE LA RODILLA	146	0.90%	0	0	0	128	17	1	47	99	33	113
8	FISTULA ANORRECTAL	146	0.90%	0	0	0	85	39	22	40	106	5	141
9	TRASPLANTE DE RINON	138	0.90%	0	0	3	64	46	25	60	78	103	35
10	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL HUMERO	126	0.80%	0	23	82	17	3	1	49	77	73	53
Subtotal		1,822	11.7%	1	41	253	952	288	287	664	1,158	1,066	756
Total General		15,550	100.00%	226	516	1,298	6,225	2,751	4,534	6,157	9,393	10,634	4,916

Fuente de Información: Departamento de Informática en salud