

**INNEHÅLL:**

1. Vad OtoDual är och vad det används för?
2. Viktig information före användning.
3. Hur du använder OtoDual?
4. Eventuella biverkningar.
5. Hur OtoDual ska förvaras?
6. Övriga upplysningar.

Ingredienser: vattenfri glycerol (99,5%), lidocainhydrokloridlösning (0,5%)

1. Vad OtoDual är och vad det används för?

OtoDual örondroppar är en medicinteknisk produkt vars verkan är baserad på glycerols osmotiska egenskaper. Huvudkomponenten i OtoDual är glycerol. Glycerol har två grundrakaraktäristiska egenskaper som är relevanta för dess användning i örondroppar:

- 1) den oljiga konsistensen av glycerol gör att den fäster försiktigt mot huden vid appliceringsstället och även har skyddande egenskaper.
- 2) glycerolens vätningsförmåga, vilket i sin tur gör att lokalt applicerat glycerol avlägsnar vatten från svullna vävnader (osmotisk effekt) vilket resulterar i minskad svullnad och därmed smärtlindring.

Glycerolen i OtoDual medicintekniska produkt tackar upp vax, hjälper att avlägsna vaxet och tjukar vare sina vätskebindande egenskaper tar den bort överskott av vätska från vävnaden i hörselgången (osmotisk effekt), vilket i sin tur leder till eliminering av akkumulering som uppstår vid inflammatoriska tillstånd i öronen såsom smärta i öronen och svullnad. Lidocain används som hjälpämne i OtoDual, för att bedöva huden, vilket förstärker effekten och dessutom lindrar smärtan i örat.

OtoDual har en stödande effekt vid:

- Inflammatoriska tillstånd karaktäriserade av svullnad, smärta och klåda i yttre hörselgången;
- Sjukdomar som åtföljs av smärta orsakade av regelbunden exponering för vatten och fukt, t.ex. en simbasång;
- Sjukdomar som åtföljs av smärta orsakad av långtidsanvändning av hörlurar eller vax, som täpper till den yttre hörselgången;
- Sjukdomar som åtföljs av smärta orsakad av frekvent användning av rengöringsmedel, som förstör det naturliga membranet som skyddar den yttre hörselgången, t.ex. schampoo, tvål, gel.

OtoDual kan användas till barn från 6 månaders ålder.

2. Viktig information före användning*Kontraindikationer och varningar***Använd inte OtoDual:**

- Om förpackningen är skadad;
- Om trumhinnan är skadad (dvs. kronisk otitis media);
- Om du är allergisk mot någon av produktens komponenter sedan tidigare;
- Om utgångsdatumet på förpackningen har passerat;
- Om patienten kommer från en operation eller kirurgiskt ingrepp i örat;
- Hos barn under 6 månaders ålder;
- Vid långvarig smärta eller svullnad orsakad av inflammatoriska tillstånd med bakteriell infektion eller svamp som orsak, dessa besvär kräver kontakt med läkaren;
- Vid rinnande öron - läckage från örat.

- OtoDual ska endast användas efter en noggrann otoskopisk undersökning utförd av en läkare.
- OtoDual ska inte appliceras i örat samtidigt som en hörselapparat sitter i, OtoDual ska appliceras en timme innan hörselapparatens sättas in i den yttre hörselgången.
- Trots att de inte finns något bevis på att OtoDual droppar har en negativ effekt vid användning under graviditet och amning så bör du rådfråga läkare om användningen av OtoDual droppar så att läkaren kan bedöma om den förväntade nyttan med OtoDual överstiger den potentiella risken.
- Om symtomen blir värre eller inte förbättras efter tre dagars användning med OtoDual örondroppar, eller om du har feber, kontakta din läkare. Långvarig smärta eller svullnad kan vara tecken på bakteriell eller svampinfektion och kan kräva ytterligare eller mer lämplig behandling.
- Endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med slemhinnor i ögon, mun, hals och näsa.
- OtoDual är avsett för tillfällig smärtlindring i öronen, under högst 3 dagar och ska inte användas under längre tid.

Användning med andra medicintekniska produkter/ läkemedel

Interaktioner med andra produkter har inte studerats. Det är dock känt att antiarytmiska läkemedel förvarrar biverkningarna av lidocain; samtidig användning kan leda till allvariga biverkningar. Cimetidin, betablockare, noradrenalin och inhalerade bedövningsmedel hämmar lidocainmetabolism genom minskat leverflöde, vilket leder till ökade serumläkemedelsnivåer.

Barbiturater, rifampicin och fenytin påskyndar

INNHOLD:

1. Hva OtoDual er og hva det brukes mot.
2. Viktig informasjon før anvendelse.
3. Hvordan brukes OtoDual?
4. Mulige bivirkninger.
5. Hvordan oppbevares OtoDual?
6. Ytterligere opplysninger.

Innholdsstoffer: vannfri glyserol (99,5%), lidocainhydroklorid (0,5%)

1. Hva OtoDual er og hva det brukes mot.

OtoDual øredråper er klassifisert som medisinsk utstyr, og effekten er basert på de osmotiske egenskapene til glyserol. Hovedkomponenten i OtoDual er glyserol. Glyserol har to grunnleggende egenskaper som er relevante for bruk i øredråper: 1) den oljete konsistensen til glyserol, som fører til at den fester seg forsiktig til huden på påføringsstedet og er ansvarlig for midlets beskyttende egenskaper og 2) hygroskopisiteten av glyserol, som fører til at glyserol som er påført lokalt fjerner vann fra hovent vev (osmotisk effekt), noe som gir redusert hevelse og dermed lindrer smerte. Glyserolinholdet i OtoDual sørger for å mykjøre ørevoks, bidrar til å fjerne ørevoks og fjerner overflødig væske fra vevet i øregangen takket være de vannbindende egenskapene (den osmotiske effekten), og eliminerer på den måten plagene som oppstår i forbindelse med inflammatoriske tilstander i øret, slik som smerter og hevelse. Lidocain er et tilleggsvirkestoff i OtoDual, og brukes som et overflateanestetikum som forsterker effekten av glyserol. I tillegg lindrer lidocain smerter i øret.

OtoDual virker også mot:

- Inflammatoriske tilstander som karakteriseres av hevelse, smerte og kløe i den ytre øregangen;
- Plager som er ledsaget av smerter forårsaket av regelmessig eksponering for vann og fuktighet, f.eks. i svømmebasseng;
- Plager som er ledsaget av smerter forårsaket av langvarig bruk av hodetelefoner eller av ørevoks som tetter den ytre øregangen;
- Plager som er ledsaget av smerter forårsaket av hyppig bruk av vaskemidler som ødelegger den naturlige membranen som beskytter den ytre øregangen, f.eks. sjampo, såpe, hårgele.

OtoDual kan brukes av barn fra 6 måneders alder.

2. Viktig informasjon før anvendelse*Kontraindikasjoner og advarsler***Bruk ikke OtoDual:**

- Dersom pakningen er skadet;
- Dersom trommehinnen er skadet (f.eks. kronisk mellomørebetennelse);
- Dersom det tidligere har blitt påvist allergi mot noen av innholdsstoffene i dette produktet;
- Dersom utløpsdatoen som er trykket på pakningen, er overskredet;
- Dersom pasienten nettopp har hatt en operasjon eller fått kirurgisk behandling i øret;
- Til barn under 6 måneder;
- Ved vedvarende smerte eller hevelse forårsaket av en inflammatorisk tilstand på grunn av bakterier eller sopp – ved slike plager må lege kontaktes;
- Ved sekresjon fra øret (lekkasje fra øret).

- OtoDual skal kun brukes etter grundig undersøkelse av øret (otoskopi) hos lege.
- OtoDual skal ikke brukes i tilfeller der høreapparat har blitt tilpasset. OtoDual skal brukes én time før høreapparatet settes inn i den ytre øregangen.
- Det finnes ikke bevis for at OtoDual har en negativ effekt dersom det benyttes under graviditet og amning. Likevel bør bruk av OtoDual i disse tilfellene konsulteres med en lege, som vurderer om fordelene med OtoDual overstiger den potensielle risikoen.
- Dersom symptomene blir verre eller det ikke er noe bedring etter tre dagars bruk av OtoDual øredråper, eller dersom du har feber, kontakt lege. Vedvarende smerte eller hevelse kan tyde på en bakteriell eller soppinfeksjon som kan kreve en annen type behandling.
- OtoDual er kun ment for utvendig bruk. Unngå kontakt med øyne, munn, svelg og neselimplinner.
- OtoDual er beregnet som en midlertidig lindring av smerter i øret, sørg for at det ikke brukes i mer enn 3 dager – må ikke brukes kronisk.

Bruk sammen med annet medisinsk utstyr eller andre legemidler

Det har ikke blitt gjort studier på hvordan OtoDual samspiller med andre produkter. Det er imidlertid kjent at antiarytmiske legemidler forsterker bivirkningene av lidocain, og samtidig bruk kan derfor forårsake alvorlige bivirkninger. Cimetidin, betablockere, noradrenalin og inhalasjonsanestetika hemmer lidocainmetabolismen på grunn av redusert blodgjennomstrømming i leveren, noe som fører til økte serumnivåer av legemidlet.

Barbiturater, rifampicin og fenytin stimulerer metabolismen av lidocain gjennom aktivering av levermikrosomale enzymer. Lidocain forsterker

INDHOLD:

1. Virkning og anvendelse af OtoDual.
2. Vigtige oplysninger inden brug.
3. Sådan skal du bruge OtoDual.
4. Mulige bivirkninger.
5. Opbevaring af OtoDual?
6. Øvrige oplysninger.

Innholdsstoffer: vandfri glycerol (99,5%), lidocainhydroklorid (0,5%)

1. Virkning og anvendelse af OtoDual.

OtoDual øredråber er medicinsk udstyr med en virkning baseret på glycerols osmotiske egenskaber. Hovedingrediensen i OtoDual er glycerol. Glycerol har to grundlæggende egenskaber, der gør det velegnet til brug i øredråber:

- 1) glycerols olieagtige konsistens får det til at binde sig nænsomt til huden på anvendelsesstedet og er dermed årsag til glycerols beskyttende egenskaber, og 2) glycerol er hygroskopisk, hvilket betyder, at glycerol ved lokal anvendelse fjerner væske fra hævet væv (osmotisk virkning), hvilket resulterer i reduceret hevelse og dermed lindring af smerten. OtoDual indeholder glycerol, som blødgør voks og hjælper med at fjerne det. Takket være glycerols væskebindende egenskaber, fjernes overskydende væske fra vævene i øregangen (osmotisk virkning), hvilket afhjælper lidelser, der opstår i forbindelse med betændelsestilstande i øret, såsom øresmerter og hevelse. Lidocain fungerer som et hjælpesstof i OtoDual, idet det virker bedøvende på hudoverfladen, forstærker virkningen af glycerol og giver yderligere lindring af øresmerter.

OtoDual har en gavnlig effekt på:

- betændelsestilstande kendetegnet ved hevelse, smerter samt kløe i den ydre øregang;
- smertefulde lidelser forårsaget af regelmæssig udsættelse for vand og fukt, f.eks. ophold i svømmebøl;
- smertefulde lidelser forårsaget af langvarig brug af høretelefoner eller voks, som tilstopper den ydre øregang;
- smertefulde lidelser forårsaget af hyppig brug af rensmidler, der ødelægger den naturlige membran, der beskytter den ydre øregang, såsom shampoo, sæbe og gel.

OtoDual kan anvendes hos børn på 6 måneder og derover.

2. Vigtige oplysninger inden brug*Kontraindikationer og advarsler***Anvend ikke OtoDual:**

- Hvis emballagen er ødelagt;
- Hvis trommehinden er skadet (f.eks. kronisk mellemørebetændelse);
- Hvis der tidligere er påvist allergi over for et eller flere af indholdsstofferne i produktet;
- Hvis udløpsdatoen på emballagen er overskredet;
- Umiddelbart efter kirurgi eller kirurgisk behandling i øret;
- Hos børn under 6 måneder;
- I tilfælde af langvarig smerte eller hevelse som følge af en betændelsestilstand, der skyldes bakterier eller svamp. Ved sådanne lidelser skal lægen konsulteres;
- I tilfælde af øreflåd - udløb af sekret fra øret.

- OtoDual bør kun anvendes efter en grundig lægeundersøgelse af øret og trommehinden (otoskopi).
- OtoDual bør ikke anvendes, mens høreapparat er påsat. OtoDual bør anvendes én time før høreapparatet påsættes i den ydre øregang.
- Der er ikke nogen dokumentation for, at OtoDual øredråber har en negativ indvirkning ved anvendelse under graviditet og amning. Dog bør brug af OtoDual øredråber drøftes med lægen, som vil vurdere, om de forventede fordele ved OtoDual opvejer den potentielle risiko.
- Kontakt lægen, hvis symptomerne tiltager, hvis du ikke oplever nogen bedring efter tre dagars brug af OtoDual øredråber, eller hvis du får feber. Langvarig smerte eller hevelse kan være tegn på en bakteriell eller svampinfektion, som kræver yderligere og mere hensigtsmæssig behandling.
- Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjne, mund, svelg og slimhinder i næsen.
- OtoDual er beregnet til midlertidig lindring af øresmerter, ikke længere end 3 dagars behandling, og bør ikke anvendes over længere tid.

Anvendelse sammen med andet medicinsk udstyr/ andre lægemidler

Der er ikke foretaget studier af interaktioner med andre produkter. Det er imidlertid kendt, at lægemidler mod hjertefejlforsyrelser forværre bivirkningerne ved lidocain. Samtidig brug kan medføre alvorlige bivirkninger. Cimetidin, betablockere, noradrenalin og bedøvelsesmidler til inhalation hæmmer metabolismen af lidocain som følge af nedsat gennemstrømming i leveren, hvilket medfører øgede niveauer af lægemidlet i serum.

Barbiturater, rifampicin og phenytoin øger metabolismen af lidocain som følge af aktivering af


metabolismen av lidokain genom aktivering av mikrosomala enzymer i leveren. Lidokain ökar effekten av muskelavslappande medel.

Tillverkaren rekommenderar inte användning av andra medicintekniska produkter/ läkemedel i form av droppar eller sprayer under användning av OtoDual. Användning av andra medicintekniska produkter/ läkemedel i form av droppar eller sprayer bör rådfrågas med läkare eller apotekspersonal.

Innan du applicerar OtoDual droppar, berätta för din läkare eller apotekspersonal om andra produkter som används i örat och alla läkemedel som nyligen tagits, inklusive de som är receptfria. Efter användning av droppar rekommenderas det inte att använda andra läkemedel, medicintekniska produkter, örondroppar i minst 30 minuter.

3. Hur du använder OtoDual?

1. Tvätta händer och skruva av korken från flaskan.
2. Luta huvudet eller lägg dig på sidan så att det örat du ska behandla är uppåt.
3. Dra försiktigt i örönsribben (nedre delen av hörselgången) bort från nacken.
4. Vänd den öppnade OtoDual flaskan upp och ned och genom att trycka på flaskans båda sidor, droppar du ut 2 droppar av produkten i örat.
5. Håll huvudet lutat i några minuter så att dropparna kan komma in i hörselgången.
6. Torka bort överflödigt vätska med rent papper.
7. Dessutom rekommenderas det att tappa till den yttre hörselgången med bomull efter applicering.
8. Skruva på korken igen.




effekten av muskelavslappande midler som virker på tverrstrepat muskulatur.

Produzenten anbefalar ikke bruk av andre legemidler i form av dråper eller spray under bruk av OtoDual. Du må rådføre deg med lege eller apotek før du bruker annet medisinsk utstyr eller andre legemidler i form av dråper eller spray.

Før bruk av OtoDual øredråper må du informere lege eller apotek om andre produkter som du bruker i øret, og alle legemidler du nylig har tatt. Dette gjelder også reseptfrie legemidler. Etter bruk av OtoDual, er det anbefalt å vente i minst 30 minutter før andre produkter brukes i øret.

3. Hvordan brukes OtoDual?

1. Vask hendene og skru av hetten på flasken.
2. Bøy hodet til siden eller legg deg ned på siden slik at øret som skal behandles, vender oppover.
3. Trekk forsiktig øreflippen (den nedre delen av øregangen) ut fra nakken.
4. Snu den åpne flasken med OtoDual oppned, og ved å trykke på begge sider av flasken presses 2 dråper av produktet inn i øret.
5. Hold hodet på siden i et par minutter slik at dråpene kommer inn i øregangen.
6. Tørk av overflødig væske med rent papper.
7. I tillegg anbefales det å beskytte øregangen med bomull etter påføring.
8. Sett hetten på flasken igjen.




mikrosomale leverenzymer. Lidocain forsterker effekten av visse muskelslappende midler.

Fremstilleren fraråder samtidig bruk af andre lægemidler i form af øredråber eller spray sammen med OtoDual. Brug af andre lægemidler eller andet medicinsk udstyr i form af øredråber eller spray bør drøftes med lægen eller apotekspersonalet.

Før anvendelse af OtoDual bør du fortælle lægen eller apotekspersonalet om andre produkter, du anvender i øret, og om alle lægemidler, du har taget for nylig, herunder håndkøbsmedicin. Efter brug af OtoDual frarådes det at anvende andre øredråber i mindst 30 minutter.

3. Sådan skal du bruge OtoDual

1. Vask hænderne, og skru derefter hæften af flasken.
2. Læg hovedet på skrå, eller læg dig ned på siden, så det øre, der skal behandles, vender opad.
3. Træk forsigtigt øreflippen (nedre del af øregangen) væk fra halsen.
4. Vend flasken med OtoDual (uden hætte) på hovedet, og dryp 2 dråber ind i øret ved at trykke på begge sider af flasken.
5. Hold hovedet på skrå i et par minutter, så dråberne kan løbe ind i øregangen.
6. Tør overskydende væske væk med en ren serviet.
7. Derudover anbefales det at stoppe den ydre øregang til med vat efter brug.
8. Sæt hæften på igen.



Dosering

Vuxna och barn från 12 års ålder: 2 droppar i örat upp till tre gånger dagligen. Om ingen förbättring sker efter 3 dagar, eller om du mår sämre, rådfråga din läkare.

Barn från 6 månaders ålder: 2 droppar i örat upp till tre gånger dagligen. Används endast under övervakning av en vuxen eller läkare. Om ingen förbättring sker efter 3 dagar, eller om ditt barn mår sämre, rådfråga din läkare.

Vid användning hos barn är det nödvändigt att skydda örat med bomull. OtoDual ska inte användas hos barn som är yngre än 6 månader. Behandlingsresultatet ska övervakas av läkare.

4. Eventuella biverkningar

OtoDual tolereras väl och inga skadliga effekter är kända vid användning. Vid allergi eller andra oönskade effekter, informera din läkare eller apotekspersonal och sluta använda dropparna. OtoDual ska endast användas i enlighet med bruksanvisningen.

Alla allvariga incidenter som har inträffat i samband med produkten bör rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten befinner sig.

5. Hur OtoDual ska förvaras?

OtoDual ska förvaras:

- Torr och vid temperaturer mellan 15°C - 25°C i upprätt läge;
- I skydd mot frost och i skydd mot kyla;
- I skydd mot direkt solljus;
- Utom syn- och räckhåll för barn.

OtoDual kan användas i 4 veckor efter att förpackningen har öppnats. Skriv ned datumet på flaskan när du applicerade dropparna första gången (angiven plats). Efter användning, kassera förpackningen i enlighet med lokala krav.

6. Övriga upplysningar

OtoDual är en medicinteknisk produkt av klass III. **Förpackning:** Flerdosflaska innehåller 7 g lösning.

Dosering

Voksne og barn over 12 år: 2 dråper i øret, opptil tre ganger daglig. Hvis det ikke er tegn til forbedring etter 3 dager eller hvis du føler deg verre, ta kontakt med lege.

Barn over 6 måneder: 2 dråper i øret, opptil tre ganger daglig. **Skal kun brukes under oppsyn av en voksen eller en lege.** Hvis det ikke er tegn til forbedring etter 3 dager eller hvis barnet ditt føler seg verre, ta kontakt med lege.

Ved bruk hos barn er det nødvendig å beskytte øret med en bomullsudd. OtoDual skal ikke brukes av barn under 6 måneder. Resultatet av behandlingen bør overvåkes av en lege.

4. Mulige bivirkninger

OtoDual er godt tolerert, og det er ingen kjente bivirkninger etter bruk. Ved allergi eller andre uønskede virkninger, må du slutte å bruke dråpene og informere lege eller apotek. OtoDual skal kun brukes i tråd med bruksanvisningen.

Enhver alvorlig hendelse som har oppstått i tilknytning til produktet skal rapporteres til produsenten, og den kompetente myndigheten i landet der brukeren og/eller pasienten er etablert.

5. Hvordan oppbevares OtoDual?

OtoDual skal oppbevares:

- Oppbevares på et tørt sted, ved temperaturer mellom 15°C og 25°C i en oppreist posisjon;
- Beskyttes mot frost og må ikke oppbevares i kjøleskap;
- Beskyttes mot direkte sollys;
- Oppbevares utilgjengelig for barn.

Etter å ha blitt åpnet, kan produktet brukes i 4 uker. Skriv datoen for første bruk av dråpene på flasken (angitt sted). Etter bruk skal emballasjen kastes i tråd med lokale forskrifter.

6. Ytterligere informasjon

OtoDual er klassifisert som medisinsk utstyr (klasse III). **Pakning:** Flerdosetaske som inneholder 7 g løsning.

Dosering

Voksne og barn over 12 år: 2 dråber i øre op til tre gange om dagen.

Kontakt lægen, hvis du ikke oplever nogen bedring efter 3 dage, eller hvis du får det værre.

Børn over 6 måneder: 2 dråber i øre op til tre gange om dagen. **Må kun anvendes under opsyn af en voksen eller en læge.** Kontakt lægen, hvis dit barn ikke oplever nogen bedring efter 3 dage, eller hvis barnet får det værre.

Ved anvendelse hos børn skal øret beskyttes ved vat. OtoDual må ikke anvendes hos børn under 6 måneder. Behandlingsresultatet bør kontrolleres af lægen.

4. Mulige bivirkninger

OtoDual er veltolereret, og der er ingen kendte bivirkninger efter anvendelse af produktet. I tilfælde af allergi eller andre uønskede virkninger: Stop med at anvende øredråberne, og kontakt lægen eller apotekspersonalet. OtoDual bør kun anvendes i overensstemmelse med bruksanvisningen.

Enhver alvorlig hændelse, der er indtruffet i forbindelse med produktet, bør indberettes til fabrikanten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

5. Opbevaring af OtoDual

OtoDual bør opbevares:

- Opretstående på et tørt sted ved en temperatur på 15°C til 25°C;
- Beskyttet mod frost, må ikke opbevares i køleskab;
- Beskyttet mod direkte sollys;
- Skjult og utilgængeligt for børn.

Efter åbning af emballagen kan OtoDual anvendes i 4 uger. Notér datoen for ibrugtagning af dråberne på flasken (der er gjort plads til det). Bortskaf emballagen i overensstemmelse med de lokale retningslinjer efter brug.

6. Yderligere oplysninger

OtoDual er medicinsk udstyr i klasse III. **Emballage:** Flerdosiflaske, der indeholder 7 g opløsning.

Distributør SE: Addeira Pharmaceuticals AB
Sydgatan 1, 151 38 Södertälje
Konsumentkontakt: info@addeira.co


Distributør NO: Bonaventura Sales AS, Henrik
Ibsens gate 60, 0225 Oslo

Distributør DK: Addeira Pharmaceuticals AB
Sydgatan 1, 151 38 Södertälje


FÖRKLARING AV DE ANVÄNDA SYMBOLER




Satsnummer
Serienummer
Serienummer




Sista användningsdatum
Bruk før utløpsdato
Består for



Medicinteknisk produkt
Medisinsk utstyr
Medicinsk utstyr



Skydda mot solljus
Beskyttes mot solljus
Beskyttes mot solljus



Unik produktidentifisering
Unik enhetsidentifikator
Unik utstyrsidentifikationskode




CE-märkning
CE-samsvarsmärkning
CE-märke




Bekanta dig med varningarna i bipacksedeln
Gjør deg kjent med advarelsene i pakningsveiledningen
Læs advarelsene i produktets indlægsseddel

FORKLARING TIL SYMBOLENE SOM BRUKES



Temperaturgränser
Begränsning av tillått lagringstemperatur
Grænse for tilladt oppbevaringstemperatur



Använd inte om förpackningen är skadad
Må ikke brukes hvis pakningen er skadet
Må ikke anvendes, hvis emballagen er ødelagt

SYMBOLFÖRKLARING



Se bruksanvisningen
Se bruksanvisningen
Se bruksanvisningen



Tillverkare
Tillverkare
Fremstiller

Datum for seneste ændring av bruksanvisningen /
Dato for siste oppdatering av bruksanvisning /
Dato for sidste revision af brugsanvisningen:
14.11.2023