

Dear Customer,

With our background as pharmacists, the well-being of people is our most important priority.

Today, we can offer a range of products that have been developed in close dialogue with pharmacies and with a continuous strive towards a more sustainable production – allowing you to simply focus on the good things in life.

We call this - Feel better, better!

With love from the founders and pharmacists at Addeira – Malcolm and Robert

Quicklax

Mikrolavemang

Läs igenom hela denna information noggrant innan du börjar använda produkten, eftersom den innehåller viktig information för dig.

Behåll denna bipackssedel. Du kan behöva läsa den igen.

- Om du upptäcker en allvarlig biverkning kopplad till produkten, informera tillverkaren direkt (för kontaktuppgifter, se nedan), samt behörig myndighet i det land där du befinner dig.

Vad som finns i denna bipackssedel:

1. Vad Quicklax är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Quicklax
3. Hur man använder Quicklax
4. Möjliga biverkningar
5. Hur man förvarar Quicklax
6. Förpackningens innehåll och annan information

1. Vad Quicklax är och vad det används för

Quicklax är ett snabbverkande mikrolavemang och är avsedd för behandling av tillfällig förstopning. Produkten myskar upp hård avföring utan att irriterat tarmen. Produkten är även lämplig att användas för tarmtömmning inför rektoskop.

2. Vad du behöver veta innan du använder Quicklax

Använd inte Quicklax:

- Om du är allergisk eller överkänstlig mot någon av ingredienserna i denna produkt (listade i avsnitt 6, Förpackningens innehåll och annan information)
- Om den engångsdosförpackade tuben har öppnats eller är skadad
- Efter utgångsdatumen.

Varningar och försiktighetsåtgärder:

Undvik långvarig användning av produkten (se avsnitt 3, Hur man använder Quicklax). Ingredienserna i produkten kan orsaka lokala hudreaktioner.

Rådfråga vårdpersonal innan du använder Quicklax

- Om du lider av kronisk förstopning.
- Om du är gravid eller ammar.
- Om du har en inflammatorisk tarmsjukdom, såsom ulcerös kolit eller Crohns sjukdom.
- Om du har fatig kolonträning (toxisk megakolon).

Andra läkemedel och Quicklax:

Undvik att använda Quicklax om du tar något läkemedel eller annan produkt som innehåller natriumpolystryrsulfonat (produkter som sänker blodets kaliumnivåer). Samtidigt användning av produkterna kan öka risken för tarmnekros.

3. Hur man använder Quicklax

Använd Quicklax rektalt. Innan administrering, se till att den engångsdosförpackade tuben är i rumstemperatur. Den rekommenderade dosen får inte överskridas.

Dosering

Vuxna och barn från 3 år.

En singeldos tub. För in hela spetsen av tuben i ändtarmen och kläm på tuben för att tömma innehållet i ändtarmen.

Barn under 3 år.

En singeldos tub. För in spetsen av tuben upp till markeringen (halva spetsen) i barnets ändtarm och kläm på tuben för att tömma innehållet i ändtarmen.

Bruksanvisning

1. Vrid för förstulningen (Bild 1).
2. Fukt spetsen med en dropp av tubens innehåll genom att försiktigt klämma på tuben.
3. För in tubspetsen i ändtarmen. Vuxna: hela spetsen.
Barn under 3 år: halva spetsen, till markeringen.
4. Töm tuben fullständigt genom att trycka på tubens ände (Bild 2).
5. Håll tuben höglämd medan du drar spetsen ut ur ändtarmen.




Bild 1



Bild 2

Vanligtvis kommer en tarmrörelse att ske inom 5–15 minuter efter att produkten har använts. Efter användning ska den engångsdosförpackade tuben inte återanvändas eftersom den inte längre är hygienisk. Släng den använda tuben även om det finns kvar produkt i tuben. Vuxna (över 18 år): Om produkten används under mer än 1–2 veckor, diskutera detta med vårdpersonal. Barn och ungdomar (från 1 till 18 år): Om produkten används under mer än 2–5 dagar, diskutera detta med vårdpersonal. För barn under 1 år ska produkten endast användas under övervakning av vårdpersonal.

Graviditet och amning:

Quicklax kan användas under graviditet och amning. Diskutera med vårdpersonal innan du börjar använda produkten.

4. Möjliga biverkningar

Quicklax kan orsaka biverkningar, även om alla inte får dem. Följande mycket sällsynta biverkningar kan förekomma: lösa avföringar, buksmärta, smärta i ändtarmsöppningen eller ändtarmen samt överkänslighetsreaktioner (som nässelsluslag).

5. Hur man förvarar Quicklax

Förvara denna produkt utom syn- och räckhåll för barn. Förvara tuberna i rumstemperatur. Frys inte. Använd inte denna produkt efter utgångsdatumen som anges på förpackningen. Utgångsdatumen som anges på förpackningen och tuben avser sista dagen i den månaden. Kasta inte bort någon oanvänt produkt via avloppet. Eventuell oanvänt eller utgången produkt ska lämnas in på apotek.

6. Förpackningens innehåll och annan information

Varje kartong innehåller 4, 12 eller 50 engångsdosförpackade tuber (5 ml). Alla förpackningsstörfaktor kan inte finnas tillgängliga på marknaden. Ingredienserna i Quicklax är: D-sorbitol (625 mg/ml), renat vatten, glycerol, natriumcitrat/dihydrat (90 mg/ml), natriumlaurylsulfat (15 mg/ml), akrylat/C10-30-alkylakrylatkopolymärer, trietanolamin, kaliumsorbat.

Förklaring av symboler på Quicklax-förpackningar.

	Tillverkare / Produsent		Använd inte om tuben är skadad / Må ikke brukes hvis tuben er skadd
	Satsnummer / Batch-nummer		Får ej förvaras över 25°C / Må ikke oppbevares ved en temperatur over 25°C
	Utgångsdatum / Utløpsdato		CE-märkning / CE-merking
	Läs bruksanvisningen före användning / Les bruksanvisningen för bruk		Återvinn som kartong / Resirkuler som papp
	Tuben är avsedd för engångsbruk / Tuben må ikke gjenbrukes		Återvinn som kartong / Resirkuler som papp
	Medicinteknisk produkt / Medisinsk utstyr		Symbolen för plasttyp på tuben / Symbolet for type plast i tuben