



# StellaLife® VEGA® Oral Care

# CLINICIAN'S GUIDE

## 3 • 3 • 3 StellaLife® Program

- Empieza 3 DÍAS antes de la cirugía o Procedimiento para aumentar los niveles terapéuticos.
- Aplicar 3 VECES al día, preferiblemente después de las comidas.
- Utiliza los 3 PRODUCTOS al mismo tiempo en el orden indicado.

## Directions

**STEP 1** **VEGA® Oral Care Rinse**



Shake well. Swish 3/4 tablespoon (10 ml) for 1-2 minutes, spit out.



**STEP 2** **VEGA® Oral Care Spray**



Spray 4 times under the tongue.



**STEP 3** **VEGA® Oral Care Gel**



Apply to the gum at the affected area or procedure site with a cotton swab.



Continuar usando los 3 productos después de la cirugía O procedimiento. Abstenerse de beber y comer durante al menos 20 minutos después de la aplicación. Consulte a su profesional de la salud para su uso en niños menores de 6 años.

## Recovery Kit



## Gel



## Rinse



CHECK OUT

- Non-staining
- Sugar-free
- Opioid-free
- Taste great
- Non-toxic\*

Spray	
<b>Active ingredients</b>	<b>Purpose</b>
Contains 7.14% of each of the following HPUS ingredients:	
Arnica 3X, 6X, 18X.....	Bruising, swelling
Calendula 3X.....	Antiseptic
Chamomilla 5X.....	Swelling
Echinacea angustifolia 3X.....	Antiseptic
Echinacea purpurea 3X.....	Antiseptic
Hepar sulph calc 8X.....	Antiseptic
Hypericum 10X.....	Bruising, wound healing
Ignatia 30X.....	Soothing
Ledum palustre 6X.....	Analgesic
Ruta 12X.....	Bruising
Silicea 8X.....	Analgesic, antiseptic
Staphysagria 8X.....	Analgesic, soothing
<b>Inactive ingredients</b>	
Citric acid, Glycerin, Potassium sorbate, Purified water.	

Gel	
<b>Active ingredients</b>	<b>Purpose</b>
Contains 0.0714% of each of the following HPUS ingredients:	
Arnica 3X, 6X, 18X.....	Bruising, swelling
Calendula 3X.....	Antiseptic
Chamomilla 5X.....	Swelling
Echinacea angustifolia 3X.....	Antiseptic
Echinacea purpurea 3X.....	Antiseptic
Hepar sulph calc 8X.....	Antiseptic
Hypericum 10X.....	Bruising, wound healing
Ignatia 30X.....	Soothing
Ledum palustre 6X.....	Analgesic
Ruta 12X.....	Bruising
Silicea 8X.....	Analgesic, antiseptic
Staphysagria 8X.....	Analgesic, soothing
<b>Inactive ingredients</b>	
Allantoin, Hydroxyethylcellulose, Peppermint oil, Purified water, Sodium benzoate, Sodium metabisulfite, Xylitol.	

Peppermint Rinse	
<b>Active ingredients</b>	<b>Purpose</b>
Contains 0.55% of each of the following HPUS ingredients:	
Azadirachta indica 1X.....	Antingivitis, swelling
Calendula 1X.....	Antiseptic
Echinacea purpurea 1X.....	Antiseptic
Plantago major 1X.....	Antiseptic
<b>Inactive ingredients</b>	
Allantoin, Citric acid, Glycerin, Peppermint flavor, Peppermint oil, Polysorbate 20, Potassium sorbate, Propolis, Purified water, Xylitol.	

Coconut Rinse	
<b>Active ingredients</b>	<b>Purpose</b>
Contains 0.25% of each of the following HPUS ingredients:	
Azadirachta indica 1X.....	Antingivitis, swelling
Apis mellifica 12X.....	Soothing, healing
Calendula 1X.....	Antiseptic
Echinacea purpurea 1X.....	Antiseptic
Okouba aubrevillei 6X.....	Soothing, healing
Phosphorous 12X.....	Analgesic
Plantago major 1X.....	Antiseptic
Strontium 30X.....	Analgesic
Thuja occidentalis 3X.....	Analgesic, soothing
<b>Inactive ingredients</b>	
Allantoin, Citric acid, Coconut flavor, Glycerin, Potassium sorbate, Propolis, Purified water, Xylitol.	

## Protocolo de manejo del dolor en la clinica dental

1. Iniciar el StellaLife®VEGA®Oral Care Recovery Kit (Rinse/Spray/Gel) 3 días antes de la operación y continuar después de la operación.
2. StellaLife®VEGA®Oral Care Gel se aplica en el sitio quirúrgico inmediatamente después de la operación.
3. Los pacientes toman 1000 mg de paracetamol y 400 mg de Motrin inmediatamente después de la operación.
4. Repita esta combinación hasta cuatro veces al día para no exceder la dosis diaria permitida.\*

Las INSTRUCCIONES DE MEDICACIÓN están disponibles para sus pacientes.

La prescripción de opioides se puede reducir en la práctica de cirugía oral. El estudio retrospectivo de tres años mostró 3 veces la reducción de opioides. Walter Tatch, DDS, FACOMS, publicado por JOMS, septiembre. 2019.\*

Distributed by: **StellaLife, Inc.**  
+1 (305) 788-8555  
StellaLife.com  
Patent No.: US 11,707,498 B2

StellaLife.com/research 

Individual results may vary. This material is for general information only and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Read the labels before using. VEGA® and Intelligent Healing® are trademarks of StellaLife®, Inc. All rights reserved.

\*Claims based on traditional homeopathic practice not accepted medical evidence. Not FDA evaluated.



# StellaLife® VEGA® Oral Care CLINICIAN'S GUIDE



DENTAL ADVISOR TOP AWARD: ORAL HEALING PRODUCT



Natural, No mancha, Sin azúcar, Sin opioides, Sin gluten, No tóxico\* Made in USA

## PROCEDIMIENTOS DE LA Injerto ÓSEO Injerto Óseo • Levantamiento Sinusal

**Kit de recuperación.** Los pacientes empiezan 3 días antes y continúan Durante 5-7 días después de la operación. Continúe usando el enjuague.

## ELIMINACIÓN DE DIENTES IMPACTADOS

**Kit de recuperación.** Consulta cómo usar el kit de recuperación.

## IMPLANTES

**Kit de recuperación o gel y enjuague.** Enjuague, para procedimientos rutinarios que no impliquen injerto óseo o regeneración ósea guiada. Postoperatorio: se indica al paciente que se enjuague durante 1-2 minutos y escupir; aplicar inmediatamente Gel en el sitio quirúrgico y la zona del vestíbulo. Repite los pasos anteriores 4x/ Día. Después de 5 días, se indica a los pacientes que remojan un hisopo en el enjuague y aplicar el hisopo en el sentido de las agujas del reloj alrededor del collar de curación del implante. Durante 1 minuto, 2-3x/día. Continuar durante los próximos 2-3 meses durante la óseo integración, cuando se atiende a los pacientes para la cita final antes de la etapa restauradora, se les indica que apliquen enjuague con un hisopo en la unión cervical de la restauración futura 2 veces al día como parte de la higiene rutinaria.

## PERIIMPLANTITIS

**Kit de recuperación o gel y enjuague.**

1. Solamente si hay inflamación de los tejidos blandos sin pérdida ósea:  
Retira la causa (residuos, cemento, etc.). Usar un Angiocath 24G para introducirlo en la bolsa periodontal y enjuagarlo con enjuague bucal VEGA (hasta 20 ml). Cuidados en casa: Aplicar el enjuague con un hisopo en la unión cervical por unos 1-2 minutos con una presión suave masajeando la encía, y luego aplique inmediatamente Gel en la misma zona. Abstenerse de comer y beber durante 20 minutos después de la aplicación. Repetir 3-4x/día durante 1 mes y luego vuelve a evaluar.

Si hay pérdida ósea: desintoxicación, implantoplastia, regeneración ósea guiada por protocolo individual. Cuidado en el hogar: aplicar el enjuague con un Q-tip en la unión cervicogingival durante aproximadamente 1-2 minutos con una presión suave masajeando la encía, luego aplicar inmediatamente Gel en la misma zona. Abstenerse de comer y beber durante 20 minutos después de la aplicación.

## EXODONCIA DE RUTINA

**Gel y enjuague postoperatorio.** Se indica al paciente que enjuague durante 1-2 minutos y expectorar; aplicar gel inmediatamente en el sitio quirúrgico. Repetir los pasos anteriores 4x/día.

## MANIPULACION DE TEJIDOS COLOCACIÓN DE ANCLAJES ORTODONTICOS, APICECTOMIA

**Kit de recuperación.** Consulta Cómo usar el kit de recuperación. Alternativa, Postoperatorio: se indica al paciente que enjuague durante 1-2 minutos y escupir, aplique inmediatamente Gel en la region unión cervicogingival. Para obtener los mejores resultados, comience 3 días antes de la operación. Repetir lo anterior pasos 3-4 x/día durante 7 días después del procedimiento.

## Alisado y Raspado Radicular

**Gel y enjuague o kit de recuperación.** Postoperatorio: se indica al paciente que se enjuague durante 1-2 minutos y escupir, aplicar inmediatamente el Gel En el sitio quirúrgico. Repite los pasos anteriores 4 veces al día. Cuidado en el hogar: Aplicar el enjuague con un hisopo en la unión cervical durante unos 1-2 minutos con una presión suave masajeando la encía, y luego aplique inmediatamente el Gel en la misma zona. Abstenerse de comer y beber durante 20 minutos después de la aplicación. Repetir 3-4x/día durante 1 mes, luego reevaluar. Nota: Para reducir Sangrado durante la PCR, iniciar pacientes en el régimen de 3 días de preoperatorio. Consulte Cómo usar el kit de recuperación.

## CIRUGIA DE TEJIDO BALNDO, CIRUGÍA PERIODONTAL Y LÁSER, FRENECTOMÍA, CIRUGÍA ÓSEA

**Kit de recuperación.** Si se utiliza tejido autógeno del paladar, Pedir al paciente que aplique con HISOPO StellaLife Gel en el sitio donante, así como en el sitio receptor y en el área del vestíbulo alrededor del sitio quirúrgico.

1. **Recomendaciones de antibióticos e instrucciones operatorias normales de los procedimientos.**
2. Después del uso inicial del régimen del kit de recuperación, los pacientes deben. Continuar usando el enjuague 2 veces al día hasta que se observe una curación completa.

## APLICACIONES NO QUIRÚRGICAS

**Boca seca:** enjuague durante 1-2 minutos para aliviar los síntomas de la resequedad oral. Repetir 3-4 veces al día. Para la sequedad de boca grave, aplique Gel después del enjuague.

**Úlceras aftosas:** aplicar Gel a la úlcera con un hisopo de 5-7x/día. Los síntomas/lesiones deben resolverse en un plazo de 2-3 días. El enjuague es muy buen complemento beneficioso del Gel y deben usarse juntos.

**Alveolo seco:** gel y enjuague. Aplicar primero gel en la clínica, déjelo en el alveolo durante 10 minutos y luego consultar con el paciente. Deberían experimentar un alivio inmediato. Para el cuidado en el hogar, usa Enjuague y Gel 4x/día. Enjuague 1-2 minutos y luego aplique inmediatamente Gel.

**Tratamiento de ortodoncia e Invisalign:** Aplicar gel en el alineador Invisalign para el dolor dental o aplicar directamente en la encía 3 veces al día o cuanto sea necesario. Use Enjuague para la higiene de rutina dos veces al día.

**Impresiones dentales:** enjuague y gel. Empezando 3 días antes, Enjuagar Durante 1-2 minutos, aplicar Gel en la unión cervicogingival. Repetir Hasta 4x/día.

**Queilitis angular:** aplicar gel en las zonas afectadas 3 veces al día hasta que se resuelve.

**Mucositis y afecciones inflamatorias crónicas de la cavidad oral:** (inc. Liquen plano) alivio temporal de los síntomas: Enjuague y gel o el kit de recuperación 3x/día de aplicación durante 1 mes, Y luego reevaluar.

Abstenerse de beber o comer durante al menos 20 minutos después de la aplicación.