


TRIANGIRL FEEL GOOD

Complemento alimenticio para el bienestar de la adolescente durante el periodo premenstrual y menstrual.

La dismenorrea afecta a más del 50% de las mujeres y su prevalencia incrementa enormemente entre las adolescentes (entre el 60 y el 80%^{1,2}).



EFEECTO ANTIINFLAMATORIO Y ANALGÉSICO:

Lípido endógeno que se sintetiza en respuesta a estímulos como daño celular, inflamación, estrés oxidativo o dolor.

Reduce la activación de los mastocitos y la producción de mediadores inflamatorios³.

Activa receptores endocannabinoides potenciando su actividad analgésica⁴.



EFEECTO ANTIINFLAMATORIO:

Planta originaria de la India, que inhibe el metabolismo del ácido araquidónico y tiene acción antiinflamatoria y/o antirreumática⁵. A su vez, inhibe las síntesis de citoquinas pro-inflamatorias⁶. Además, se utiliza como estimulante de la digestión, antiemético y para la prevención del mareo del viajero⁷.



EFEECTO ANTIOXIDANTE Y ANTIINFLAMATORIO:

Planta herbácea que contiene compuestos fenólicos y flavonoides, a los que se les atribuye funciones antioxidantes y antiinflamatorias. Además, se le atribuye actividad hepatoprotectora, renoprotectora, antimicrobiana y antiviral⁸.

Recomendado en: Dismenorrea ➡ Dolor intenso pélvico y abdominal que puede aparecer antes o durante la menstruación.

MODO DE EMPLEO:

a) Ante molestias bruscas durante tu regla, toma 2 cápsulas (1 toma). Si al cabo de dos horas persisten, repite con una segunda toma.

b) Si necesitas anticiparte, toma 2 cápsulas, 2 veces al día durante 2-3 días antes de tener la regla, dejando mínimo 6 horas entre tomas. Continúa 1-2 días más al inicio de la regla.



CN: 217397.2

PEA bajo la marca: **Levagen+** Una marca propiedad de Gencor

INGREDIENTES ACTIVOS	Por toma (2 cápsulas)	Por dosis diaria (4 cápsulas)
Levagen+™ (Palmitoleitanolamida)	350 mg	700 mg
Exto. seco de jengibre 5% gingeroles	33,5 mg	67 mg
Extracto seco de hinojo	25 mg	50 mg

Solo contiene azúcares naturalmente presentes.



Evidencia científica


Evidencia científica con PEA Levagen®:

Ensayo clínico aleatorizado, controlado, a doble ciego. Población: 80 mujeres sin problemas de salud, >18 años, con historial de dolor menstrual leve-moderado, con reglas regulares, que suelen tomar al menos 1 analgésico en cada ciclo (en el estudio no tomaron analgésico, únicamente el producto del estudio).⁹

Procedimiento:

Seguimiento durante 4 ciclos: 2 ciclos con PEA (Levagen®) + 2 ciclos con PLACEBO, en orden aleatorio y ellas desconocían qué estaban tomando en cada ciclo.

Total de ciclos registrados= 248 (Levagen: 121, Placebo: 127)



RESULTADOS:

- Tras 1 hora de tomar 1 comprimido de Levagen, ya había una reducción mayor del dolor que con placebo. Seguridad: no se observaron diferencias en cuanto a seguridad.

Levagen es un PEA más biodisponible. Levagen+® es una forma de PEA con tecnología LipiSpense® que aumenta su solubilidad en ambientes acuosos logrando concentraciones plasmáticas 1,75 veces mayores que el PEA genérico¹¹.



Evidencia científica propia de TRIANGIRL FEEL GOOD:

Ensayo clínico aleatorizado, con 80 mujeres de 18-29 años con historial de dolor menstrual leve-moderado, con reglas regulares, que suelen requerir analgésicos en cada ciclo.¹¹

Procedimiento:

Seguimiento durante 4 ciclos: 1 ciclo sin complemento + 3 ciclos con TRIANGIRL FEEL GOOD:

- GRUPO PAUTA RESCUE:** 1 toma cuando empieza el dolor + 1 segunda toma en 2 horas.
- GRUPO PAUTA PREPARE:** 2 tomas/día (separadas 6h), 3 días previos + 2 días al inicio del ciclo.



RESULTADOS:

- Tras la toma del producto (en ambas pautas), se observó una reducción del dolor, una disminución de los síntomas pre/perimenstruales y una mejora de la calidad de vida de las mujeres. Seguridad: no se notificó ningún acontecimiento adverso.