

Les maladies de la corne

(ulcère de la sole, lésion de la ligne blanche, semelle double)
(Fourbure)

Les maladies de la corne sont douloureuses mais à des degrés variables passant de modéré à sévère. La plupart du temps, les onglons arrière seront affectés. Dans les cas aigus de fourbure, les onglons sont souvent chaud, les animaux ont de la difficulté à se tenir debout, à se promener et ils sont souvent couchés. Le dos voûté et les mouvements lents sont également fréquents. Aux stades plus tardifs, les onglons poussent plus plats et développent des anneaux de croissance sur les murs de l'onglon, ce qui indique une attaque de fourbure.

CAUSES

L'environnement de la vache est l'une des principales causes de la maladie de la corne. Le manque d'espace, le logement inadéquat, des couloirs étroits, des tournants à 90 degrés, la marche excessive et le temps d'attente sont des facteurs à prendre en considération. La fourbure peut aussi être causée par des toxines bactériennes relâchées dans les tissus lors de problèmes alimentaires de maladies systémiques ou autres types de stress, spécifiquement autour des périodes de vêlage. Les rations déséquilibrées, la fièvre du lait, la mammite ou la métrite devraient être prises en charge pour éviter la boiterie. Les stress environnementaux et les problèmes métaboliques engendrent la production de corne appauvrie. Un parage non conforme, inadéquat ou peu fréquent entraîne un déséquilibre entre les onglons, ce qui crée des points de pression néfastes pour une formation adéquate de la corne.

PRÉVENTION ET GESTION

Il est important de porter une attention particulière au confort de l'environnement. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace et de logements confortables pour vos animaux. Minimisez les temps d'attente afin de permettre aux vaches un maximum de repos. Veillez à ce que les rations soient bien équilibrées, surtout en période pré-vêlage, afin d'éviter tout problème métabolique. Prévoyez un horaire de parage deux à trois fois par année comme moyen de prévention. En cas de fourbure, il est important de restaurer l'onglon à sa forme normale et l'équilibre entre les deux doigts en taillant bien les quatre pieds.

Suite à l'endos...

Les maladies de la corne

... Suite

APERÇU

Lutter contre le ou les facteurs fréquents qui contribuent aux problèmes de fourbure :

- Effectuer un balancement préventif des onglons (parage 2-3 fois par an).
- Consulter un vétérinaire sur une base régulière pour la gestion de la santé et des traitements adéquats.
- Contacter votre nutritionniste pour assurer un équilibre approprié des rations.
- Réduire les temps d'attente excessifs pour tous les animaux.
- Éviter les planchers glissants et trop rugueux pour maintenir une marche dans un environnement non stressant.
- Prévoir du temps d'exercice hors des surfaces en béton pour stimuler la circulation sanguine dans les tissus.
- Avoir suffisamment de logements pour permettre à chacune des vaches de se reposer et éviter la surpopulation.
- Éviter les excès de poids pour réduire les problèmes de vêlage et le poids supplémentaire sur les onglons.


Utilisez **Hoof-fit Gel** pour le traitement des dermatites digitales.



Charte des maladies

Les problèmes d'onglons
chez les bovins





Piétin d'étable - Érosion du talon

(Dermatite interdigitale)
(Infectieuse)

La dermatite interdigitale, c'est comme un eczéma humide avec une odeur caractéristique. Les infections de la peau interdigitale (en particulier près du bulbe) provoquent une circulation de sang plus élevée, qui stimule la formation de corne supplémentaire et de mauvaise qualité. Cette formation supplémentaire entraîne des crevasses en talon qui formeront un V. Cette affection est plus fréquente lorsque les animaux sont logés à l'intérieur et exposés à des conditions humides.

CAUSES

Une infection chronique causée par *Bacteroides Nodosus*.

PRÉVENTION

- Éviter le surpeuplement des installations.
- Prendre soin de garder une litière sèche et une ventilation adéquate, afin de conserver un climat d'étable frais.
- Maintenir la propreté des allées pour garder les pieds propres et secs. L'utilisation de racleurs d'allées est recommandée.
- Avoir un programme de pédiluve et / ou un programme de vaporisation en place.

GESTION

- Parer toutes les vaches régulièrement (2-3 fois par an).
- Parer les onglons afin d'enlever l'excédent de corne et les crêtes.
- Contactez-nous afin de vous informer du protocole de vaporisation et de l'horaire de pédiluve qui répondrait le mieux aux exigences de votre troupeau.



Piétin d'Italie

(Dermatite digitale)
(Infectieuse)

La dermatite digitale est une inflammation de la peau autour de l'onglon d'une vache. Elle est le plus souvent trouvée à l'arrière du pied entre les talons, mais la maladie peut se propager autour du pied et dans l'espace interdigité ainsi qu'au paturon et sous les ergots. La dermatite digitale est une condition très douloureuse causant la boiterie, par conséquent la prise alimentaire est réduite, la production laitière diminue ainsi que la fertilité. On reconnaît la dermatite digitale par son allure de fraise au stade aiguë avec ou sans longs poils. La lésion chronique est plutôt grisâtre aux allures d'une verrue.

CAUSES

La bactérie *Treponema (Spirochète)*, souvent en combinaison avec divers facteurs environnementaux, est une cause possible des verrues poilues (Piétin d'Italie).

PRÉVENTION

- Maintenir la propreté des allées pour garder les pieds propres et secs. L'utilisation de racleurs d'allées est recommandée.
- Acheter des animaux PROPRES et savoir d'où ils viennent. Examiner et traiter les nouveaux arrivants, en particulier les génisses.
- Éviter le surpeuplement des installations.
- Prendre soin de garder une litière sèche et une ventilation adéquate, afin de conserver un climat d'étable frais.
- Prévenir les carences en zinc et en magnésium.
- Avoir un programme de pédiluve et / ou un programme de vaporisation en place.

GESTION

- Après le parage, appliquer **Hoof-Fit Gel** et un bandage aux onglons atteints. Si nécessaire, répéter cette procédure après 3 jours.
- Parer toutes les vaches régulièrement (2-3 fois par an).
- Contactez-nous afin de vous informer du protocole de vaporisation et de l'horaire de pédiluve qui répondrait le mieux aux exigences de votre troupeau.



Piétin

(Phlegmon interdigité)
(Infectieuse)

L'apparition soudaine d'une boiterie est généralement combinée avec de la fièvre et une perte de production. La peau entre les onglons et au-dessus du pied est gonflée, douloureuse et chaude au toucher. L'inflammation est concentrée sur le pied de l'animal.

CAUSES

Cette condition est provoquée principalement par deux bactéries: la *Fusobacterium necrophorum* et la *Bacteroides Melanogenicus*. Ces bactéries sont présentes dans la plupart des logements. Elles entrent dans la peau par l'intermédiaire de petites plaies entre les onglons et, par la suite, provoquent une inflammation.

PRÉVENTION

- Maintenir la propreté des allées pour garder les pieds propres et secs. L'utilisation de racleurs d'allées est recommandée.
- Éviter les petites pierres, les sols irréguliers et le surpeuplement des installations.
- Prendre soin de garder une litière sèche et une ventilation adéquate, afin de conserver un climat d'étable frais.
- Avoir un programme de pédiluve et / ou un programme de vaporisation en place.

GESTION

- Consulter un vétérinaire pour le traitement des cas graves. Cette infection se loge en profondeur dans le pied, et une médication pourrait être nécessaire.
- Parer toutes les vaches régulièrement (2-3 fois par an).
- Contactez-nous afin de vous informer du protocole de vaporisation et de l'horaire de pédiluve qui répondrait le mieux aux exigences de votre troupeau.