

Quantités de produit Hoof-Sol Bath

Bain de pieds traditionnel vs Intra-Bath®

STRATÉGIE DE ROUTINE

Quantité de Hoof-Sol® Bath nécessaire pendant une période de 4 semaines dans un BAIN DE PIEDS TRADITIONNEL¹

		Capacité du bain de pieds (Litres)						
		100	150	200	250	300	350	400
Nombre de vaches	100	20	30	40	50	60	70	80
	150	30	45	60	75	90	105	120
	200	36	54	72	90	108	126	160
	250	50	75	100	125	150	175	200
	300	60	90	120	150	180	210	240
	350	70	105	140	175	210	245	280
	400	80	120	160	200	240	280	320
	450	90	135	180	225	270	315	360
	500	100	150	200	250	300	350	400

STRATÉGIE INTENSIVE

Quantité de Hoof-Sol® Bath nécessaire pendant une période de 4 semaines dans un BAIN DE PIEDS TRADITIONNEL¹

		Capacité du bain de pieds (Litres)						
		100	150	200	250	300	350	400
Nombre de vaches	100	45	68	90	113	135	158	180
	150	68	101	135	169	203	236	270
	200	90	135	180	225	270	315	360
	250	113	169	225	281	338	394	450
	300	135	203	270	338	405	473	540
	350	158	236	315	394	473	551	630
	400	180	270	360	450	540	630	720
	450	203	304	405	506	608	709	810
	500	225	338	450	563	675	788	900



Quantité de Hoof-Sol® Bath nécessaire pendant une période de 4 semaines dans le INTRA-BATH®² (Grandeur standard de 160 litres.)

STRATÉGIE DE ROUTINE

STRATÉGIE INTENSIVE

		STRATÉGIE DE ROUTINE	STRATÉGIE INTENSIVE
Nombre de vaches	100	21	48
	150	32	72
	200	43	96
	250	53	120
	300	64	144
	350	75	168
	400	85	192
450	96	216	
500	107	240	



Directives pour le pédiluve

STRATÉGIE INTENSIVE

Évaluation du troupeau	Traitement au gel ou par vaporisation		Bain de pieds 5 %	Bain de pieds 5 %	Bain de pieds 5 %			Bain de pieds 5 %	Bain de pieds 5 %		Vaporisation des cas suspects	Vaporisation des cas suspects			Bain de pieds 5 %	Bain de pieds 5 %						Bain de pieds 5 %	Bain de pieds 5 %				
Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
Semaine 1							Semaine 2							Semaine 3							Semaine 4						

STRATÉGIE DE ROUTINE

Évaluation du troupeau et traitement au gel	Bain de pieds 5 %	Bain de pieds 5 %												Bain de pieds 5 %	Bain de pieds 5 %												Évaluation du troupeau et traitement au gel
Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
Semaine 1							Semaine 2							Semaine 3							Semaine 4						

Stratégie	Moment de l'utilisation (Total de 12 périodes par an)	Fréquence
Intensive	À suivre lors de la première utilisation des produits Hoof-Sol, lorsqu'une forte incidence de Dermatite digitale (Mortelaro, fraises, piétin d'Italie) est notée sur les sabots ou lorsque les conditions de l'étable suggèrent une augmentation des cas de Dermatite digitale.	+/- 3 fois par année
De routine	À suivre dans les conditions normales de faibles taux de Dermatite digitale.	+/- 9 fois par année

Tous les calculs sont basés sur un programme de deux traites par jour.

¹Le bain traditionnel a généralement besoin de produits frais tous les 200 vaches pour être efficace.

² Le Intra-Bath a besoin de produits frais tous les 300 vaches.



Hoof-Sol Gel

- Les sabots doivent être taillés 2 à 3 fois par an.
- Nettoyez le sabot.
- Appliquez Hoof-Sol Gel sur le sabot et dans l'espace interdigital.
- Lors de cas sévères, il est conseillé de panser le sabot. Après 4 jours maximum, retirez le pansement.

Hoof-Sol Liquid

- Aspergez les sabots ainsi que les espaces interdigitaux avec de l'eau afin de les nettoyer.
- Préparez un mélange à 50 % Hoof-Sol Liquid, 50 % eau froide.
- Vaporisez le Intra Hoof-Sol Liquid à l'arrière du sabot et dans l'espace interdigital en utilisant un pistolet à basse pression.