



MY WAY TO GROW

 Fertilization plan
Coco cultivation

 Bemestingschema
Kokos

 Plan de fertilización
para cultivo en Coco

MAIN FERTILIZERS

STIMULATORS



Coco Forte A

Coco Forte B

ML / 10 LTR

Roots

X-cel

The Missing Link

BN-Zym

Vitasol

Silution

	Coco Forte A	Coco Forte B	EC**	Roots	X-cel	The Missing Link	BN-Zym	Vitasol	Silution
Growth period Groeiperiode Periodo de crecimiento	9	9	0,9	8	5	6	5	-	2
Start flowering phase Start bloeiperiode Comienzo (o principio) de floración	13	13	1,2	7	5	6	5	-	2
	16	16	1,4	5	8	6	5	-	2
	18	18	1,6	-	8	6	5	-	2
Mid flowering phase Midden bloeiperiode Mitad floración	18	18	1,6	-	10	6	5	-	2
	18	18	1,6	-	10	6	5	4	2
	18	18	1,6	-	10	6	5	7	2
Last flowering phase Laatste bloeiperiode Fin de la floración	16	16	1,4	-	10	6	5	8	2
	<13	<13	1,2	-	10	6	5	10	2
Rinse last week Laatste week spelen Enjuagar la ultima semana	-	-	-	-	-	-	5	7	-



SUBSTRATES



Cocomix Plus



Coco Brick



Tips Coco

- When using Coco Forte A+B: first mix A in the vessel, then mix in B.
- When using Silution, first add water to the feed vessel, then silution and stir well. Wait 30 minutes, then mix in the main fertilizers and stimulators.
- Adjust the pH to $\pm 5.5 - 6.5$.
- For the best results we recommend to use our Cocomix Plus or Coco Bricks.
- In areas of soft water or when using RO-water, it is recommended to add Ca 15 (± 4 ml./10 liters) and MgO 10 (± 4 ml./10 liters) to the fertilizer mix.
- The dosage of fertilizers can be adjusted in steps of 10% more or less.
- For long flowering plants and when using Longflower-Supermix, the schedule should be extended from mid flowering.

** EC value is measured with Reverse Osmosis water with EC 0.0.



Longflower Supermix

Autoflower Supermix

Tips Kokos

- Bij gebruik Coco Forte A+B: eerst A mengen, daarna B erbij mengen.
- Wanneer Silution gebruikt wordt, eerst water aan de tank toevoegen, daarna Silution toevoegen en goed roeren. Wacht 30 minuten, daarna de hoofdmeststoffen en stimulators mengen.
- pH stellen naar $\pm 5.5 - 6.5$.
- Voor optimaal resultaat raden wij aan onze Cocomix Plus of Coco Bricks te gebruiken.
- In gebieden met zacht water of met gebruik van RO-water, is het aanbevolen Ca 15 (± 4 ml./10 liter) en MgO 10 (4 ml./10 liter) aan de meststoffenmix toe te voegen.
- De dosering van de hoofdmeststof mag $\pm 10\%$ aangepast worden.
- Bij langbloeiende planten en het gebruik van Longflower-Supermix moet het schema verlengd worden vanaf midden bloeifase.

** EC waarden zijn gemeten in Osmose water met EC 0.0.

Consejos Coco

- Cuando use Coco Forte A + B: primero mezcle A en el tanque, luego agregue y mezcle B.
- Cuando use Silution, primero agregue agua al tanque de alimentación, luego Silution y revuelva bien. Espere 30 minutos y luego mezcle los fertilizantes principales y los estimuladores.
- Ajuste el pH a $\pm 5.5 - 6.5$.
- Para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizar nuestro Cocomix Plus o Coco Bricks.
- En áreas de agua blanda o cuando se usa agua RO, se recomienda agregar Ca 15 (± 4 ml./10 litros) y MgO 10 (± 4 ml./10 litros) a la mezcla de fertilizante.
- La dosis de fertilizantes se puede ajustar en pasos de más o menos 10%.
- Para plantas de floración larga y cuando se usa Longflower-Supermix, el programa debe ser extendido desde mediados de floración.

** El valor EC se mide con agua de ósmosis inversa con CE 0.0.





MY WAY TO GROW

 **Calendrier de fumure Coco**

 **Piano di fertilizzazione per coltivazione in Cocco**

 **Plano de fertilização Cultivo Coco**

MAIN FERTILIZERS

STIMULATORS



SUBSTRATES



Cocomix Plus



Coco Brick

			EC**	ML / 10 LTR							
	Coco Forte A	Coco Forte B		Roots	X-cel	The Missing Link	BN-Zym	Vitasol	Silution		
Période de croissance Periodo di crescita Período de crescimento	9	9	0,9	8	5	6	5	-	2		
Début période de floraison Inizio fioritura Fase inicial de floração	13	13	1,2	7	5	6	5	-	2		
	16	16	1,4	5	8	6	5	-	2		
	18	18	1,6	-	8	6	5	-	2		
Milieu période de floraison Metà fioritura Fase intermédia de floração	18	18	1,6	-	10	6	5	-	2		
	18	18	1,6	-	10	6	5	4	2		
Dernière période de floraison Fine fioritura Fase final de floração	16	16	1,4	-	10	6	5	8	2		
	<13	<13	1,2	-	10	6	5	10	2		
Rincer la dernière semaine Risciacquare l'ultima settimana Lavagem na semana passada	-	-	-	-	-	-	5	7	-		



Conseils Coco

- En cas d'utilisation de Coco Forte A+B: d'abord mélanger A, puis mélanger B dedans.
- En cas d'utilisation de Silution, d'abord ajouter l'eau dans le récipient, puis ajouter Silution et bien mélanger. Attendre 30 minutes, puis mélanger les engrais principaux et les stimulateurs.
- Régler le niveau de pH entre env. 5,5 et 6,5.
- Pour un résultat optimal, nous recommandons d'utiliser notre Cocomix Plus ou nos Coco Bricks.
- Dans les régions où l'eau n'est pas calcaire ou en cas d'utilisation d'eau par osmose inverse, il est recommandé d'ajouter Ca 15 (env. 4 ml./10 litres) et MgO 10 (4 ml./10 litres) au mélange d'engrais.
- Le dosage de l'engrais principal peut être modifié d'env. 10 %.
- Avec des plantes à longue floraison et en cas d'utilisation de Longflower-Supermix, le calendrier doit être prolongé à partir du milieu de la phase de floraison.

** Les valeurs CE ont été mesurées dans une eau osmosée avec CE 0.0.

Longflower Supermix



Autoflower Supermix

Consigli Cocco

- Quando si utilizza Coco Forte A+B: Riempire d'acqua il serbatoio di nutrizione, poi aggiungere A mescolando vigorosamente, dopodiché aggiungere B continuando a mischiare.
- Se si sta utilizzando Silution, come prima cosa riempire d'acqua il serbatoio dopodiché aggiungere Silution, mischiare con cura la soluzione ed attendere circa 30 min. Infine aggiungere gli altri fertilizzanti, A+B e booster.
- Regolare il pH a $\pm 5,5 - 6,5$.
- Per risultati stupefacenti raccomandiamo l'utilizzo del nostro Cocomix Plus o Coco Bricks.
- In zone caratterizzate da acqua morbida o in caso di utilizzo di acqua da Osmosi inversa, si consiglia di aggiungere alla soluzione nutritiva Ca 15 (± 4 ml./10 litri) e MgO 10 (± 4 ml./10 litri).
- Il dosaggio dei fertilizzanti può essere modificato ad intervalli del 10 % circa.
- Per piante caratterizzate da un lungo periodo di fioritura e quando si usa Longflower-Supermix, la scheda di coltivazione andrebbe prolungata a partire da metà fioritura.

** Valore EC misurato in soluzione con acqua ad osmosi inversa EC 0.0.

Tips Coco

- Ao usar Coco Forte A+B: primeiro misture A no recipiente, depois misture B.
- Ao usar Silution, primeiro adicione água ao recipiente, depois adicione Silution e mexa bem. Aguarde 30 minutos, depois misture os principais fertilizantes e estimuladores.
- Ajuste o pH para $\pm 5,5 - 6,5$.
- Para obter os melhores resultados, recomendamos o uso do nosso Cocomix Plus ou Coco Bricks.
- Em áreas de água doce ou ao usar água RO, recomenda-se adicionar Ca 15 (± 4 ml./10 litros) e MgO 10 (± 4 ml./10 litros) à mistura de fertilizantes.
- A dosagem de fertilizantes pode ser ajustada em etapas de 10% mais ou menos.
- Para plantas com floração longa e ao usar o Longflower-Supermix, o plano deve ser estendido a partir da fase de floração intermédia.

** O valor EC é medido com água Reverse Osmosis com 0,0 EC.