

ASMA FELINO Y LA BRONQUITIS CANINA

ETAPAS DEL TRATAMIENTO Y PAUTAS DE DOSIFICACIÓN.

1 Tratamiento de la exacerbación

Asegúrese de que el animal pueda respirar

- Dilate de forma inmediata las vías respiratorias para proporcionar un alivio respiratorio.
- Administre esteroides inyectables y broncodilatadores inhalables o inyectables.
- Las inyecciones se deben administrar en una clínica o en un hospital.
- Los broncodilatadores se pueden administrar en clínicas o el dueño de la mascota puede administrarlos en su hogar.

MEDICAMENTOS



Pauta de dosificación	
Dexametasona	0,1–1,0 mg/kg por vía IM o IV
Terbutalina	0,01 mg/kg por vía IM o SC
Salbutamol / albuterol	1–2 descargas, cada 30 minutos por hasta ≤4–5 horas

Notas

- Los dueños que no puedan recuperar el control de la enfermedad en el hogar deben llevar a su mascota a un centro veterinario.

2 Lograr controlar las vías respiratorias

Despeje las vías respiratorias

- Reduzca la inflamación de las vías respiratorias y recupere el control de estas.
- Proporcione un tratamiento a corto plazo con esteroides sistémicos.
- Tratamiento de 10 días.

MEDICAMENTOS



Pauta de dosificación	Gatos	Perros
Prednisolona	1,0–2,0 mg/kg oral cada 24 h	
Prednisona		0,5–1,0 mg/kg oral cada 24 h

Notas

- Revise las modificaciones medioambientales para reducir los activadores.
- Asegúrese de que los dueños de mascotas entiendan que los esteroides sistémicos solo son tratamientos temporales.
- Los dueños de mascotas que ya usan inhaladores y que trataron la exacerbación con salbutamol pueden continuar un tratamiento con esteroides inhalados.

3 Transición a los inhaladores

Inicie el tratamiento con inhaladores

- Reduzca la dosis de esteroides sistémicos cuando inicie el tratamiento con esteroides por inhalación.
- Superponga el tratamiento durante 2 semanas.
- Los esteroides inhalados apuntan de manera eficaz a las vías respiratorias para controlar la enfermedad sin experimentar los efectos secundarios de los esteroides sistémicos.

MEDICAMENTOS



Pauta de dosificación	Gatos y perros ≤ 20 kg (44.1 lb)	Perros > 20 kg (44.1 lb)
Fluticasona [‡]	1 descarga 110 µg cada 12 h	1 descarga 220 µg cada 12 h
Fluticasona + salmeterol	1 descarga 115 µg / 21 ug cada 12 h	1 descarga 230 µg / 21 ug cada 12 h

[‡] Los gatos con enfermedades más graves pueden requerir 220 µg dos veces al día.

Notas

- Los esteroides inhalados pueden tardar dos semanas en hacer efecto.

4 Manejo diario

Mantenga la enfermedad bajo

- Continúe el tratamiento para mantener la inflamación controlada y prevenir la exacerbación.
- Administre el tratamiento a diario para controlar los síntomas.
- Las personas que tengan gatos pueden administrar broncodilatadores por inhalación cuando la enfermedad empeore por la exposición a activadores.

MEDICAMENTOS



Pauta de dosificación	Gatos y perros ≤ 20 kg (44.1 lb)	Perros > 20 kg (44.1 lb)
Fluticasona [‡]	1 descarga 110 µg cada 12 h	1 descarga 220 µg cada 12 h
Fluticasona + salmeterol	1 descarga 115 µg / 21 ug cada 12 h	1 descarga 230 µg / 21 ug cada 12 h
Salbutamol / albuterol	1–2 descargas cuando sea necesario (gatos)	

[‡] Los gatos con enfermedades más graves pueden requerir 220 µg dos veces al día.

Notas

- El salbutamol es un medicamento de rescate y no debe utilizarse como monoterapia.
- Los caninos no presentan broncoconstricción. Existe muy poca evidencia que demuestre que el salbutamol sea eficaz para tratar la bronquitis canina.