

# ACETAPRID 200 SP

INSECTICIDA AGRÍCOLA

<b>CLASE</b>	Insecticida Agrícola
<b>INGREDIENTE ACTIVO</b>	Acetamiprid..... 200 g/Kg
<b>GRUPO QUÍMICO</b>	Neonicotinoide
<b>FORMULACIÓN</b>	Polvo soluble (SP)
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
<b>Nº REGISTRO</b>	PQUA Nº 799 – SENASA
<b>TITULAR DE REGISTRO</b>	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
<b>TOXICIDAD</b>	Etiqueta con franja de color <b>Amarillo</b> Moderadamente peligroso. Dañino
<b>MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN</b>	<b>ACETAPRID 200 SP</b> es un insecticida sistémico de amplio espectro con actividad translaminar que actúa por contacto e ingestión. <b>ACETAPRID 200 SP</b> es eficaz para el control de mosca blanca, queresa y thrips en diversos cultivos como pimiento, palto y cebolla respectivamente. <b>ACETAPRID 200 SP</b> tiene efecto sobre los huevos, ninfas y adultos de insectos.

**CUADRO DE USOS**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200L	Kg/ha		
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.15-0.2	0.45-0.6	7	0.02
Palto	Queresa	<i>Fiorinia fioriniae</i>	0.1	0.5	21	0.01
Pimiento	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.1	0.3	7	0.3

**P.C.:** Período de carencia

**L.M.R.:** Límite máximo de residuos

<b>INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO</b>	<p>Aplicar en aspersión foliar.            Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación con agua hasta la mitad, agregue la dosis recomendada, agite y complete el tanque con agua.            Evitar la aplicación cuando se tenga presencia de vientos fuertes.            -Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta.            -Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto.            -Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados.            -Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.</p>
<b>FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El momento de aplicación es cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga.</li> <li>- Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga-cultivo.</li> <li>- Se recomienda hasta un máximo de 3 aplicaciones por Campaña/año.</li> <li>- Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.</li> </ul>

<b>PERIODO DE REINGRESO</b>	Puede reingresar sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.
<b>COMPATIBILIDAD</b>	<b>ACETAPRID 200 SP</b> es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente alcalina u oxidante.
<b>FITOTOXICIDAD</b>	<b>ACETAPRID 200 SP</b> no es fitotóxico cuando es utilizado según se recomienda.
<b>MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS</b>	Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
<b>TELÉFONOS DE EMERGENCIA</b>	Infosalud: 0800-10828 (las 24 horas) CICOTOX: 08001-3040 / 328-7398 ESSALUD: 0801-10200 CISPROQUIM: 0800-50847